

Lactulosum Hasco, syrop na zaparcia, 150 ml



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco
Substancja czynna	Lactulosum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Lactulosum Hasco syrop, 150 ml

(Lactulosum liquidum)

Opis produktu:

Lactulosum Hasco jest to lek w formie syropu, którego substancją czynną jest laktuloza ciekła - syntetyczny dwucukier. Syrop działa przeczyszczająco i jest przeznaczony zarówno dla osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci, w tym niemowląt.

Skład:

- Substancja czynna - laktuloza ciekła 2,5 g
- Substancje pomocnicze - aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej (w przeliczeniu na syntetyczny disacharyd - laktulozę).

Wskazania:

Produkt wskazany jest:

- dla osób w każdym wieku, którym dolegają zaparcia,
- w celu zapobiegania i leczenia encefalopatii wątrobowej.

Działanie:

- Syrop Lactulosum Hasco zawiera laktulozę ciekłą, która rozkładana jest w okrężnicy do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego, a także do dwutlenku węgla. Powstałe kwasy powodują obniżenie pH w okrężnicy do pH = 5-5,5. Obniżone pH przyczynia się do zatrzymania wody w jelicie, grubym, a co za tym idzie do zwiększenia i rozluźnienia mas kałowych oraz stymulacji perystaltyki jelit.
- U osób z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła dodatkowo wpływa na zmniejszenie toksyczności amoniaku - obniżone pH przyczynia się do przekształcenia amoniaku w jony amonowe, które są nietoksyczne i nie wchłaniają się w jelitach.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- Lek Lactulosum Hasco przeznaczony jest do podania doustnego.
- **W przypadku zaparc**, zalecana dawka dla osoby dorosłej wynosi początkowo 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) w ciągu doby podawana rano, przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami.
- **Dawka podtrzymująca dla dorosłych** wynosi 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na czczo.
- **U dzieci powyżej 3 roku życia** zaleca się początkowo podawanie 5 do 15 ml syropu (2,5 do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę, następnie w odstępach 3 dni można stopniowo zwiększać dawkę, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
- **Dzieciom poniżej 3 lat** zaleca się podawać 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę i dawkę tę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
- **W przypadku niemowląt** zalecana dawka początkowa to 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę, następnie dawkę można zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
- **U dorosłych cierpiących na encefalopatię wątrobową** zaleca się stosowanie 120 do 180 ml syropu (60 do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę podzielonego na 3-4 dawki. Ilość dawek należy dostosować tak, aby w ciągu doby liczba oddawanych luźnych stolców nie była większa niż 2-3, ponieważ duże dawki leku w tym wskazaniu mogą powodować biegunkę.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników oraz jeśli pacjent cierpi na niedrożność jelit.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Produkt może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli dawka początkowa wywołuje nudności należy ją zmniejszyć.
- Lek zawiera laktozę i galaktozę, pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów przed przyjęciem syropu powinni skonsultować się z lekarzem.
- Długotrwałe stosowanie lub stosowanie w nadmiernych ilościach może przyczynić się do wystąpienia biegunki z nadmierną utratą wody i elektrolitów oraz do zwiększenia stężenia sodu we krwi. Z tych względów należy wykonywać okresowo badanie stężenia elektrolitów, w szczególności tyczy się to osób w wieku podeszłym stosujących syrop dłużej niż 6 miesięcy.

Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Lactulosum Hasco może być stosowany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią jedynie za zgodą lekarza.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- Syrop można podawać z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Stosowanie neomycyny i leków zobojętniających kwas żołądkowy może powodować osłabienie działania laktulozy ciekłej w okrężnicy.
- Laktuloza ciekła może przyczyniać się do obniżenia stężenia potasu we krwi, przez co może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B) oraz może nasilić działanie glikozydów nasercowych.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.