

Lakcid Intima, kapsułki dopochwowe twarde, 10kapsułki



Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Lakcid Intima kapsułki dopochwowe 10 sztuk

(Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus)

Opis produktu:

Lakcid Intima jest to produkt leczniczy w postaci kapsułek dopochwowych, które zawierają liofilizowane, żywe pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870 wyizolowane z pochwy zdrowej kobiety. Lakcid Intima **zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.**

Skład:

Substancje czynne:

- Pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10⁸ CFU* na kapsułkę,
- Pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 10⁸ CFU* na kapsułkę.

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

Substancje pomocnicze - etanol 96% (v/v), woda.

Wskazania:

- Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy u kobiet. Można stosować u dziewcząt w wieku 12 do 16 lat (które zaczęły miesiączkowanie) po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach jak u dorosłych.

Działanie:

- Działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych.
- Lakcid Intima przywraca lub utrzymuje prawidłową florę bakteryjną pochwy.
- Pałeczki kwasu mlekowego stosowane miejscowo, dzięki swym właściwościom wpływają na równowagę mikrobiologiczną ograniczając rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, ponieważ utrzymują odpowiednie kwaśne pH pochwy i mogą redukować objawy takie jak świąd, pieczenie, upławy oraz nieprzyjemny zapach.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować dopochwowo.

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej:

- **Profilaktycznie:** Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo. U kobiet miesiączkujących - po miesiączce.
- **Po antybiotykoterapii:** Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

- Nie należy stosować leku Lakcid Intima, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku.
- Lakcid Intima może wystąpić pieczenie w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- U kobiet z ciężkimi zaburzeniami układu odpornościowego należy zachować szczególną ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

U dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat (które rozpoczęły miesiączkowanie) lek można stosować po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach jak u dorosłych.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie należy stosować leku Lacid Intima w czasie antybiotykoterapii, ponieważ pałeczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869 i *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870 są wrażliwe na antybiotyki.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S. A. , Pelplińska 19, Starogard Gdański

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.