

Laktomag B6 50 tabletek

Cena: 9,20 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Amara
Substancja czynna	Magnezium, Pyridoxinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Laktomag B6 - 50 tabletek smak bananowy

(Magnezii hydroaspartas+Pyridoxini hydrochloridum)

Opis produktu:

Laktomag B6 to produkt leczniczy zawierający magnez w postaci soli organicznej i witaminę B6, która zwiększa biodostępność magnezu

Skład:

- **Substancja czynna** - magnez (Magnezii hydroaspartas) i witamina B6 (Pyridoxini hydrochloridum)
- **Substancje pomocnicze** - celuloza mikrokryształiczna, powidon, krzemionka koloidalna, aromat bananowy, aspartam, magnezu stearynian

1 tabletkę zawiera 1000 mg wodorooasparagianu magnezu (70 mg jonów Mg²⁺) oraz 5 mg chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6)

Wskazania:

Lek do stosowania m.in:

- w profilaktyce niedoboru magnezu i/lub witaminy B6
- w przewlekłym zmęczeniu fizycznym i psychicznym
- nadpobudliwości nerwowej
- sytuacjach stresowych, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni
- arytmii serca, zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca
- leczeniu osteoporozy

Działanie:

- uzupełniające niedobory magnezu oraz witaminy B6 w codziennej diecie
- profilaktycznie w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, w sytuacjach stresowych, bólach mięśni

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dzieci 1-3 lat:

- 2 x dziennie po 1/2 tabletki

Dzieci 4-6 lat:

- 3 x dziennie po 1/2 tabletki

Dzieci 7-10 lat:

- 2 x dziennie po 1 tabletkę

Dzieci powyżej 10 lat:

- 3 x dziennie po 1 tabletkę

Dorośli:

- 3 x dziennie po 1 tabletkę.

Małym dzieciom można podawać tabletki tylko po rozgnieceniu i zmieszaniu z wodą

- lek do stosowania doustnego

- tabletki można podzielić lub rozgnieść

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

Jeśli pacjent cierpi na:

- ciężką niewydolność wątroby i nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, znaczne niedociśnienie tętnicze, zwolniona akcja serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)
- myasthenia gravis, choroba Parkinsona (leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy)
- zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznana:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, luźne stolce, zaczerwienienie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- jeśli podczas stosowania leku wystąpią zaburzenia czynności nerek i serca, należy skonsultować się z lekarzem
- lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny, może być szkodliwy u osób z fenyloketonurią

Ciąża, karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- leku nie należy stosować na czczo ze względu na ryzyko biegunki
- produkty białkowe ułatwiają przyswajanie magnezu
- lek stosować z dużą ilością wody

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Należy zachować odstęp czasu jeśli pacjent przyjmuje tetracykliny (antybiotyki)

- może wchodzić w interakcje z metyldopą (spadek wchłaniania i osłabienie działania metyldopy)

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.