

## Levopront, syrop na kaszel suchy, 120 ml



Cena: 27,69 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Dompe
Substancja czynna	Levodropropizinum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Levopront, syrop 60 mg/10 ml - 120 ml

(Levodropropizinum)

### Opis produktu:

Levopront to produkt leczniczy do stosowania w kaszlu suchym (nieproduktywnym) różnego pochodzenia, np. towarzyszącego chorobom infekcyjnym. Syrop wykazuje działanie przeciwkaszlowe, dodatkowo znosi skurcz oskrzeli. Przeznaczony jest dla dzieci od drugiego roku życia i dorosłych.

### Skład:

- **substancja czynna:** lewodropropizyna
- **pozostałe składniki:** sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.

## Wskazania:

Leczenie objawowe kaszlu suchego (np. towarzyszącego zakażeniu górnych i dolnych dróg oddechowych).

## Działanie:

- Levopront zawiera lewodropropizynę, która wykazuje działanie przeciwkaszlowe (obwodowe).
- Znosi również skurcz oskrzeli.
- Łagodzi suchy kaszel.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Masa ciała dziecka:

- **10-20 kg** - 3 ml syropu 3 razy na dobę
- **20-30 kg** - 5 ml syropu 3 razy na dobę

**Dorośli:** 10 ml syropu 3 razy na dobę.

- Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
- Syrop może być stosowany u dzieci od 2. roku życia.
- Syrop powinien być stosowany w odstępach 6-godzinnych.

## Przeciwwskazania:

### Nie stosować leku Levopront:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje nadmierna wydzielina oskrzelowa, zaburzenia czynności rzęsek (w obrębie nabłonka oskrzeli - zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek),
- u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

## Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy,
- reakcje skórne,

- bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka,
- zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie,
- kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego,
- drażliwość, senność,
- depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia),
- duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego,
- niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.

#### Częstość nieznaną:

- zapalenie języka i aftowe zapalenie jamy ustnej z gorączką,
- stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby (cholestatyczne zapalenie wątroby),
- przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia,
- napady padaczki - duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrgawkowy, tzw. napad typu petit mal),
- rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku,
- przypadki obrzęku powiek, które w większości można uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Levopront** może wchodzić w interakcję z:

- lekami uspokajającymi (szczególnie u osób wrażliwych).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed rozpoczęciem stosowania leku **Levopront** należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Leki przeciwkaszlowe to leki objawowe i można je stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.
- Syrop należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku i w przypadku zaburzonej pracy nerek.
- **Levopront** zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera parahydroksybenzoesany, może powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

#### Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- **Levopront** zaleca się stosować między posiłkami.

#### Ciąża i karmienie piersią:

- Lek jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- **Levopront** może być stosowany u dzieci powyżej 2. roku życia.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- **Levopront** może powodować senność. Należy zachować ostrożność u osób, które zamierzają prowadzić pojazd lub obsługiwać maszyny. W przypadku wystąpienia senności należy zrezygnować z prowadzenia auta.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181B, Warszawa.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.