

Lioton żel 50g heparyna



Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka A.MENARINI INDUSTRIE PHARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.I.

Substancja
czynna Heparinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Lioton 1000 żel - 50g

(Heparinum natricum)

Opis produktu:

Żel **Lioton 1000** jest lekiem do stosowania na skórę, który dzięki zawartości heparyny, wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Skład:

Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).

1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej.

Substancje pomocnicze : karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

Wskazania:

- **Lioton 1000** stosuje się wspomagająco w leczeniu:
- chorób żył powierzchownych, takich jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych;

- krwiałków podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Działanie:

- Zawarta w preparacie heparyna poprawia mikrokrażenie, dzięki czemu **Lioton 1000** działa przeciwobrzękowo. Ponadto, lek wykazuje miejscowe działanie o charakterze przeciwzakrzepowym oraz przeciwzapalnym.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lioton 1000 stosuje się na skórę, 1 do 3 razy na dobę, nakładając pasek żelu o długości 3-10 cm na powierzchnię skóry i delikatnie masując, aż do wchłonięcia żelu.

W przypadku obrzęków po urazach zaleca się stosowanie leku przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych przez 1 do 2 tygodni.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku:

- w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (zwłaszcza u osób z alergią na parabeny).
- na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust.
- w przypadku krwawienia.
- Leku nie wolno przyjmować doustnie.

Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, **Lioton 1000** może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie, świąd skóry) lub objawy reakcji pseudoalergiczných. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną

Stosowanie innych leków

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Ponieważ brak jest badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci poniżej 12 lat, leku Lioton 1000 nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Podmiot odpowiedzialny:

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

3 Via Sette Santi, 50 131 Florencja Włochy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.