

Lipancia, 8000j.Ph.Eur. lipazy, enzymy trzustkowe, 50kapsułek



Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Pancreatinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Lipancia 8000 j. lipazy 50 kapsułek

(Pancreatinum)

Opis produktu:

Lipancia 8000 to produkt leczniczy zawierający pankreatynę, mieszaninę enzymów trzustkowych. Stosuje się go do uzupełnienia poziomu enzymów trzustkowych po wycięciu trzustki oraz poprawia trawienie w stanach zmniejszonego wydzielania enzymów.

Skład:

Substancje czynne: pankreatyna (Pancreatinum)

Substancje pomocnicze - kwasy metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), symetykon, emulsja 30% trietylu cytrynian; talk, żelatyna; żelaza tlenek czerwony (E 172); tytanu dwutlenek (E 171).

1 kapsułka zawiera pankreatynę o aktywności: lipazy 8000 j. Ph. Eur., amylazy 5750 j. Ph. Eur., proteaz 450 j. Ph. Eur.

Wskazania:

Lek **Lipancrea 8 000** stosuje się w przypadku upośledzenia czynności trzustki, spowodowanego:

- przewlekłym zapaleniem trzustki,
- wycięciem trzustki bądź jej części,
- wycięciem żołądka,
- zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową,
- mukowiscydozą - chorobą dziedziczną objawiającą się tym, że organizm produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje poważne zaburzenia w narządach, np. płucach, trzustce.

Działanie:

- Lek **Lipancrea 8 000** umożliwia trawienie, (po wycięciu trzustki oraz poprawia trawienie w stanach zmniejszonego wydzielania enzymów), ułatwia przyswojenie składników odżywczych zawartych w pożywieniu oraz usuwa zaburzenia trawienia. Zapobiega wystąpieniu objawów takich jak uczucie przepełnienia żołądka po jedzeniu, wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty..

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: doustnie, podczas posiłku popijając każdą kapsułkę płynem. Kapsułkę należy połykać w całości, nie należy jej żuć i kruszyć.

- Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych: 2-4 kapsułki do każdego posiłku.
- Nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.
- Podanie leku z pożywieniem o odczynie lekko kwasowym lub zasadowym (np. jajka, kurczaki, cielęcina, zielony groszek) może zmniejszać jego skuteczność.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować **Lipancrea 8000**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę, białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma ostre zapalenie trzustki.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- bóle brzucha.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- zaparcia, biegunka (szczególnie przy stosowaniu dużych dawek), nudności, wymioty,
- reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- świąd skóry nie wymagający odstawienia leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować ostrożność jeśli lek podawany jest dzieciom z mukowiscydozą przyjmującym duże dawki enzymów, ponieważ w rzadkich przypadkach zanotowano u tych dzieci zwężenie jelita.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Stosowanie u dzieci: wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Lipancrea 8000 może wchodzić w interakcje z:

- lekami stosowanymi na zgagę i nadkwaśność (np. cymetydyna, ranitydyna, famotydyna),
- kwasem foliowym i solami żelaza (również obecnymi w pożywieniu).

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Pofa S. A., Karolkowa 22/24. 01-207 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.