

Lipomal syrop 125g

Cena: 20,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Tilia platyphyllos
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Lipomal syrop - 125g

(Tiliae inflorescentiae extractum siccum)

Opis produktu:

Lipomal jest stosowany tradycyjnie jako środek w stanach gorączkowych oraz pomocniczo w przeziębieniach, w stanach zapalnych gardła i kaszlu

Skład:

- **Substancja czynna** - suchy wyciąg z kwiatostanu lipy (Tiliae inflorescentiae extractum siccum)
- **Substancje pomocnicze** - maltodekstryna, sacharoza, benzoosan sodu (E211), kwas cytrynowy, guma ksantanowa, aromat malinowy AR0320, woda oczyszczona

5 ml syropu zawiera 97,089 mg wyciągu z Tilia cordata Millet, Tilia platyphyllos Scop., Tilia vulgaris Heyne lub ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V.

Wskazania:

- jako łagodny środek napotny w stanach gorączkowych
- pomocniczo w przeziębieniach, w stanach zapalnych gardła, w kaszlu

Działanie:

- **Kwisatostan lipy** - tradycyjnie stosowany jako łagodny środek napotny, pomocniczo w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła lub w kaszlu

Skuteczność syropu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

- Odpowiedni dla dzieci od 1. roku życia

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do opakowania dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć 5 ml, 10 ml syropu.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 3 lat:

- Po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 3 lat do 12 lat:

- 5 ml syropu 4 do 5 razy na dobę

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli:

- 10 ml syropu 3 do 4 razy na dobę

Sposób podawania: podanie doustne

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Działania niepożądane:

- Brak danych dotyczących działań niepożądanych produktu leczniczego

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-

Jeśli gorączka nie ustępuje po 3 dniach lub przekroczy 39°C, należy skontaktować się z lekarzem. Również w przypadku wystąpienia duszności lub ropnej wydzieliny należy poradzić się lekarza

Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Sacharoza

- Produkt leczniczy zawiera 4,03367 g sacharozy w 5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą
- Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego
- Dawka 5 ml syropu zawiera 4 g sacharozy, czyli 0,4 jednostki chlebowej.
- Dawka 10 ml syropu zawiera 8 g sacharozy, czyli 0,8 jednostki chlebowej.

Benzoesan sodu (E211)

- Produkt leczniczy zawiera 10,44 mg benzoesanu sodu w 5 ml syropu.

Glikol propylenowy

- Produkt leczniczy zawiera 9,708 mg glikolu propylenowego w 5 ml syropu.

Sód

- Produkt leczniczy zawiera 1,66 mg sodu w 5 ml syropu.
- Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 5 ml syropu, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”

Glukoza (jako składnik maltodekstryny)

- Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego

Dzieci i młodzież:

- Lek można stosować u dzieci od 1. roku życia.
- W przypadku wątpliwości, a także przed zastosowaniem leku u dzieci w wieku 1-3 lat, należy skonsultować się z lekarzem

Ciąża, karmienie piersią:

- W przypadku ciąży lub karmienia piersią, przypuszczenia ciąży lub planowania dziecka należy przed zastosowaniem tego leku

poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Brak szczegółowych danych nt. wpływu leku Lipomal na ciążę, karmienie piersią i płodność

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek jest uważany za bezpieczny
- Nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.