

Liv.52 100 tabletek



Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka World Markets

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Liv.52, 100 tabletek

Opis produktu:

Lek ziołowo-mineralny stosowany wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby i w stanach rekonwalescencji.

Liv.52 pobudza czynność wydzielniczą wątroby, pobudza wydzielanie żółci (działa choleretycznie), co daje ochronny wpływ na wątrobę, zmniejszając objawy infekcji bakteryjnych, wirusowych i wpływu substancji szkodliwych takich jak: leki (np. antybiotyki, leki przeciwgruźlicze), środki chemiczne (np. związki metali) i alkohol.

Skład:

Każda tabletką zawiera:

- Capparis spinosae cortex 65 mg
- Cichorii intybus semen 65 mg
- Solani nigri herba 32 mg
- Terminaliae arjunae cortex 32 mg

- Cassiae occidentalis semen 16 mg
- Achilleae millefolii semen 16 mg
- Tamarix gallicae herba 16 mg
- Mandur Bhasma (zawartość żelaza Fe+2 i Fe+3 w ilości 3 mg) 33 mg

Wykaz substancji pomocniczych

- Stearynian magnezu
- Dwutlenek krzemu koloidalny
- Celuloza mikrokrystaliczna
- Kroskarmeloza sodowa
- Karboksymetyloceluloza sodowa

Wskazania:

Liv.52 jest lekiem ziołowo-mineralnym w postaci tabletek, stosowanym wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby i w stanach rekonwalescencji.

Działanie:

Mechanizm ochronnego działania Liv.52 na wątrobę tłumaczy się:

- przyspieszeniem wydalania z żółcią szkodliwych substancji i metabolitów,
- zmniejszeniem utleniania lipidów i tworzenia się wolnych rodników.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli:

- Wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.
- Wspomagająco w stanach po zatruciach lekami od 1 do 2 tabletek, 2 razy na dobę .
- W alkoholowych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 razy na dobę
- W okresie rekonwalescencji 2 tabletki 2 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- Zalecana dawka leku u młodzieży to 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.

Dzieci:

- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Sposób podawania:

- Podanie doustne. Tabletki należy połykać pół godziny przed posiłkiem.

Czas stosowania:

- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Astraceae, dawniej Compositae, złożonych) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

W dotychczasowych obserwacjach podawania produktu Liv.52 ludziom nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie zaobserwowano działań niepożądanych w trakcie badań przedklinicznych i klinicznych Liv.52 tabletki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

- Nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu Liv.52 przez pacjentów z poważniejszymi uszkodzeniami wątroby, z marskością i zwłóknieniem wątroby ponieważ jego stosowanie nie jest w takich przypadkach skuteczne. Decyzję o podawaniu preparatu Liv.52 w takich stanach należy podjąć na podstawie właściwej diagnostyki i wyników badań. W razie podejrzenia wystąpienia żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub zażółcenia białkówki gałki ocznej), przed zastosowaniem leku, należy zgłosić się do lekarza.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

- Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań klinicznych stosowania preparatu Liv.52 u kobiet w ciąży.
- Dostępne są wyniki dawnych obserwacji klinicznych podawania preparatu Liv.52 ograniczonej liczbie (84+35) kobiet z objawami żółtaczki i zatrucia ciążyowego. Ze względu na brak danych na temat monitorowania działań niepożądanych, podczas przepisywania tego leku należy zachować ostrożność.
- Dotychczasowe badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działania na ciążę lub w okresie okołourodzeniowym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także, o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje farmakodynamiczne:

Dotychczas nie zaobserwowano specyficznych interakcji z lekami.

Interakcje farmakokinetyczne:

Podczas podawania preparatu Liv.52 jednocześnie z ibuprofenem, obserwowano istotne obniżenie jego stężenia w surowicy krwi, prawdopodobnie wywołane przez opóźnienie wchłaniania ibuprofenu bez istotnej zmiany jego biodostępności.

Dzieci i młodzież:

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie.
- Przechowywać w temperaturze od 10°C-30°C.
- Okres ważności produktu w opakowaniu handlowym 3 lata

Podmiot odpowiedzialny:

World Markets Sp. z o.o.;04-980 Warszawa, ul.Olecka 23

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.