

Loratadyna Pylox 10mg alergia 10 tabletek



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	GALENA
Substancja czynna	Loratadinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Loratadyna Pylox 10 mg, tabletki - 10 sztuk

(Loratadinum)

Opis produktu:

Lek **Loratadyna Pylox** przeznaczony do leczenia objawów sezonowego i całorocznego alergicznego nieżyty nosa, a także przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Skład:

Substancje czynne: loratadyna.

Substancje pomocnicze - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian.

Jedna tabletki zawiera 10 mg loratadyny.

Wskazania:

Leczenie objawów:

- sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
- przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Działanie:

- Lek Loratadyna Pylox łagodzi objawy takie jak : kichanie, swędzenie, wodnista wydzielina z nosa, obrzęk błon śluzowych, świąd i pieczenie oczu, spowodowanych przez sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (jedna tabletką) raz na dobę.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat stosuje się dawkę w zależności od masy ciała:

- **Masa ciała większa niż 30 kg:** 10 mg (1 tabletką) raz na dobę
- **Masa ciała mniejsza niż 30 kg:** 5mg (pół tabletki) raz na dobę u dzieci w wieku powyżej 6 lat.. U dzieci w wieku od do 6 lat zaleca się stosowanie syropu (5mg)

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Kiedy nie należy stosować leku **Loratadyna Pylox**:

- jeśli występuje nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest dobrze tolerowany.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

- **często** (występują u 1 do 10 osób na 100): ból głowy, nerwowość i zmęczenie (u dzieci w wieku od 2 do 12 lat), senność (u dorosłych i młodzieży).
- **niezbyt często** (występują u 1 do 10 osób na 1 000): ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu u dorosłych i młodzieży.
- **bardzo rzadko** (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000) : anafilaksja (ciężka reakcja alergiczna z występującymi nagle trudnościami w oddychaniu, obrzękiem twarzy lub gardła, ciężkimi zawrotami głowy); w razie wystąpienia opisanych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala, zawroty głowy, drgawki, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca, nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie.
- **częstość nieznana** (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zwiększenie masy ciała.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Loratadyna Pylox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Leczenie należy przerwać na około 48 godzin przed terminem wykonania testów skórnych, ponieważ loratadyna może fałszywie powodować ujemne wyniki tych testów (lek ten może zmniejszać lub całkowicie zahamować reakcje skórne, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia)

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Należy unikać stosowania leku Loratadyna Pylox w ciąży.
- Ze względu na to, że loratadyna przenika do mleka matki, nie zaleca się jej stosowania u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:

- Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
- Alkohol nie nasila działania loratadyny, jednak podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Podczas stosowania leku bardzo rzadko u niektórych osób może wystąpić uczucie senności, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Należy zachować ostrożność stosując loratadynę z erytromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem i cymetydyną, gdyż może to spowodować zwiększenie stężenia loratadyny we krwi.
- Jednoczesne przyjmowanie loratadyny z niektórymi lekami wpływającymi na metabolizm wątroby, takimi jak inhibitory CYP3A4 lub CYP2D6, zwiększa stężenie loratadyny we krwi, co może powodować nasilenie działań niepożądanych.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy GALENA, Krucza 62, Wrocław.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.