

# Loxon 2% płyn przeciw łysieniu, 60 ml



Cena: 47,49 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Loxon
Substancja czynna	Minoxidilum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Loxon Max 2%, 20mg/ml płyn na skórę - 60 ml

(Minoxidilum)

## Opis produktu:

Lek Loxon 2% ma postać płynu do stosowania na skórę głowy, zawiera substancję czynną minoksydyl. **Minoksydyl pobudza porost włosów w łysieniu typu androgenowego u kobiet i mężczyzn.** Zahamowanie wypadania włosów stwierdzono w drugim miesiącu stosowania, porost włosów rozpoczyna się przeważnie po dwóch miesiącach leczenia lekiem Loxon. **Maksymalny efekt uzyskuje się po około 12 miesiącach systematycznego stosowania.**

## Skład:

- Substancja czynna - minoksydyl
- Substancje pomocnicze - glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, kwas cytrynowy.

1 ml płynu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu.

## Wskazania:

Lek Loxon 2% jest stosowany w leczeniu łysienia androgenowego (wypadania włosów) u kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat.

## Działanie:

- Pobudzenie porostu włosów,
- odwracanie lub hamowanie miniaturyzacji mieszków włosowych,
- pobudzanie namnażanie się komórek mieszków w fazie wzrostu.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1 ml płynu (10 rozpyleń) należy rozprowadzić w miejscu łysienia i wmasować w skórę (najczęściej szczyt głowy i zakola czołowe).

- Lek stosuje się dwa razy na dobę.
- Objętość 1 rozpylenia wynosi 0,1 ml.
- Nie przekraczać dawki 2 ml w ciągu doby.
- Po nałożeniu płynu na skórę głowy dokładnie umyć ręce.
- Leczenie należy przerwać, jeśli poprawa nie nastąpi po 1 roku stosowania.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

**Nie stosować leku Loxon:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze,
- w przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów.
- jeżeli utrata włosów związana jest z ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób,
- jeśli pacjent ma ogoloną lub zmienioną chorobowo skórę głowy (np. występuje łuszczyca, stan zapalny, skóra głowy jest zaczerwieniona, podrażniona, lub bolesna),
- jeśli pacjent stosuje opatrunki okluzyjne (uszczelniające) lub stosuje miejscowo inne leki.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, ponieważ może być konieczna pilna pomoc medyczna:

- Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia połykanie lub oddychanie. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
- Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): może wystąpić ból głowy, ból w klatce piersiowej, świąd, miejscowy rumień, nadmierny wzrost włosów, wysypka, zapalenie skóry, obrzęk.
- Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): może wystąpić niedociśnienie, wysuszenie i (lub) łuszczenie się skóry głowy oraz przejściowa utrata włosów.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna - obrzęk może obejmować twarz, kończyny, okolice jamy ustnej, krtań i powodować trudności w oddychaniu).

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami, stosowanymi miejscowo na skórę głowy.
- Substancje takie, jak kortykosteroidy, tretynoina, ditranol oraz wazelina mogą zmieniać właściwości ochronne warstwy rogowej naskórka, co może prowadzić do zwiększonego wchłaniania leku do krwi i jego działania ogólnego.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie należy stosować leku Loxon 2% na inne miejsca na skórze niż miejsca łysienia na skórze głowy.
- W razie przypadkowego zabrudzenia lekiem innych miejsc na skórze, może wystąpić niepożądany wzrost włosów w tych miejscach, dlatego po nałożeniu leku na skórę głowy należy dokładnie umyć ręce.
- Lek Loxon 2% przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Lek Loxon 2% należy stosować wyłącznie na prawidłową, zdrową skórę głowy.
- Pacjenci z rozpoznanymi chorobami układu krążenia lub zaburzeniami rytmu serca przed rozpoczęciem leczenia lekiem Loxon 2% powinni zasięgnąć porady lekarza.
- U niektórych pacjentów po zastosowaniu minoksydylu doszło do zmiany koloru i (lub) struktury włosów.
- Zastosowanie większej lub częstszej dawki leku Loxon 2% niż zalecana, nie wpłynie na przyspieszenie leczenia.
- Należy unikać wdychania oparów i mgiełki roztworu. Nie połykać.
- Lek Loxon 2% zawiera glikol propylenowy.
- Lek Loxon 2% zawiera etanol 96%

## Ciąża, karmienie piersią:

- Leku Loxon 2% nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

- Nie oczekuje się, aby produkt Loxon 2% wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

**Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat):**

- Nie należy stosować leku Loxon 2% u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat i u osób w wieku powyżej 65 lat.

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Perrigo Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

**Dodatkowe informacje:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.