

Maalox, zgaga, niestrawność, 40tabletek



Cena: 22,45 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sanofi
Substancja czynna	Alumini hydroxydum, Magnesii hydroxidum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Maalox 400 mg+400 mg, tabletki - 40 sztuk

(Alumini hydroxydum, Magnesii hydroxidum)

Opis produktu:

Maalox to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu objawowym nadkwaśności, zgadze, nieżycie żołądka.

Skład:

Substancje czynne: wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu.

Substancje pomocnicze - mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, sacharoza zawierająca 3% skrobi, sacharoza.

Wskazania:

Maalox jest wskazany w leczeniu objawowym nadkwaśności i dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego jak:

- nieżyt żołądka,
- zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony,
- niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności.

Maalox może być stosowany pomocniczo w leczeniu:

- choroby wrzodowej dwunastnicy,
- choroby wrzodowej żołądka.

Działanie:

- Maalox jest lekiem złożonym, o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego, ściągającym i osłaniającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.
- Nie powoduje nadmiernego zobojętnienia treści żołądka i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- 1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku Maalox jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Nie stosować leku Maalox:

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- biegunki lub zaparcia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca,
- hipermagnezemia.

Częstość nieznana:

- reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy),
- hiperaluminemia,
- hipofosfatemia,

- ból brzucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować ostrożność w stosowaniu **Maaloxu** u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, u dzieci poniżej 6 lat (stosować jedynie po konsultacji z lekarzem), u pacjentów w podeszłym wieku.
- Stosowanie produktu u małych dzieci może prowadzić do hipermagnezemii.
- Produktu nie należy stosować długotrwale.
- **Maalox** zawiera sacharozę (wskazówka dla chorych na cukrzycę) oraz sorbitol (nie stosować u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów)

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Maaloxu kobiet w okresie ciąży.
- Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające
- Maalox jest zalecany w okresie ciąży tylko w razie konieczności.
- Należy wziąć pod uwagę, że obecność jonów glinu i magnezu może spowalniać pasaż jelitowy.-sole wodorotlenku magnezu mogą wywoływać biegunkę,-sole glinu są przyczyną zaparć i mogą nasilać zaparcia występujące zwykle w czasie ciąży.
- Należy unikać stosowania tego produktu leczniczego przez długi czas oraz w dużych dawkach.

Karmienie piersią:

- Z powodu ograniczonego wchłaniania do mleka matki dopuszcza się stosowanie skojarzenia wodorotlenku glinu i soli magnezu podczas karmienia piersią jeśli produkt jest stosowany zgodnie z zaleceniami

Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:

- Lek stosować po posiłku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek.
- U małych dzieci stosowanie wodorotlenku magnezu może spowodować wystąpienie hipermagnezemii, zwłaszcza jeśli stwierdza się u nich zaburzenie czynności nerek lub odwodnienie.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

•

Maalox należy zażywać nie wcześniej niż 2 godziny po zażyciu innego leku (w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 godziny) lub 1-2 godziny przed przyjęciem innego leku.

Maalox może wchodzić w interakcje z:

- fluorochinolonami, tetracyklinami, linkozamidami,
- lekami blokującymi receptor H2,
- atenololem, propranololem,
- digoksyną,
- ketokonazolem,
- glikokortykosteroidami,
- lewotyroksyną,
- rosuwastatyną,
- salicylanami,
- solami żelaza.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.ul. Bonifraterska 1700-203 Warszawa

Zawartość opakowania: 40 tabletek

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd,

poinformuj nas o tym.