

Magne B6 Forte magnez 60 tabletek



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sanofi
Substancja czynna	Magnesium, Pyridoxinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Magne B6 Forte, 100 mg + 10 mg - 60 tabletek powlekanych

(Magnesii citras + Pyridoxini hydrochloridum)

Opis produktu:

Magne B6 Forte to produkt leczniczy w postaci tabletek powlekanych, który uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych. Zawiera dobrze przyswajalną sól magnezu - **cytrynian**.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

- jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) - 100 mg
- pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) - 10 mg

Substancje pomocnicze to - laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu.

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
- objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
- kurcze mięśni, mrowienie, drżenie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy

Działanie:

Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowoderek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli** - od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku
- **Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6 lat lub starszych (o masie ciała około 20 kg)** - od 10 do 30 mg/kg mc. na dobę tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i stosujących lewodopę.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nadwrażliwość
- biegunka, ból brzucha
- reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wyprysk, rumień

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- **Lewodopa** - Produkt leczniczy Magne B6 Forte jest przeciwwskazany u pacjentów otrzymujących lewodopę w monoterapii (tj.

bez inhibitorów obwodowej dopa-dekarboksylazy), ponieważ pirydoksyna zmniejsza lub hamuje aktywność lewodopy.

- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania **solii wapnia i fosforanów**, ponieważ składniki te hamują jelitowe wchłanianie magnezu
- Podanie produktu leczniczego Magne B6 Forte należy odłożyć na co najmniej 3 godziny **po zastosowaniu doustnych tetracyklin**.
- **Chinolony** - należy podawać co najmniej dwie godziny przed lub sześć godzin po zastosowaniu produktów na bazie magnezu, aby uniknąć zakłócenia ich wchłaniania

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- należy zachować szczególną **ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek** ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi
- na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas **może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna** (uczucie mrowienia).
- **lek zawiera laktozę**

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- lek może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- lek wskazany dla dzieci od 6 roku życia i masie ciała około 20 kg

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- lek należy przyjmować podczas posiłków, popijając wodą

Płodność:

- badania nad witaminą B6 wykazują wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach
- bezpieczeństwo Magne B6 Forte jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- lek Magne B6 Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym