

Magnokal Asparaginian, magnez,potas x 50 tabletek



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Teva
Substancja czynna	Magnesium, Kalii hydrogenoaspartas
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Magnokal Asparaginian - 50 tabletek

(250 mg Magnesii hydroaspartas + 250 mg Kalii hydroaspartas)

Opis:

Magnokal Asparaginian to lek wskazany jest wspomagająco w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego oraz w okresach rekonwalescencji

Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

- magnezu wodorasparaginian (Magnesii hydrogenoaspartas) i potasu wodorasparaginian (Kalii hydrogenoaspartas)

1 tabletkę zawiera:

- magnezu wodorasparaginian czterowodny 250mg

- potasu wodowoasparginian półwodny 250mg
- pozostałe składniki leku to: skrobia ziemniaczana, powidon 25 magnezu staerynian

Lek nie zawiera cukru

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dorośli:

- doustnie od **2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych** po posiłkach

Wskazania:

- lek **Magnokal Asparaginian** wskazany jest do leczenia wspomagającego w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego (w niemierności i nadpobudliwości serca - szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej).
- używany jest do profilaktyki i leczenia stanów niedoboru magnezu i potasu, w okresach rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych
- w zatruciu glikozydami nasercowymi
- uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych

Działanie:

- **kwasy asparaginowe** - bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu
- **potas i magnez** - są jonami biorącymi udział w wielu przemianach metabolicznych organizmu

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Magnokal Asparaginian**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- występuje ciężka niewydolność nerek
- zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi
- zakażenia dróg moczowych
- zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) serca
- zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia)

- myasthenia gravis - choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni
- znaczne niedociśnienie tętnicze krwi

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niekiedy mogą wystąpić:

- zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i biegunka), które zwykle ustępują samoistnie, metaliczny smak w ustach
- zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- leku nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała)
- leku **Magnokal Asparaginian** nie należy stosować w czasie antybiotykoterapii i z innymi lekami zawierającymi potas
- ostrożnie stosować w razie choroby wrzodowej żołądka
- u osób z niewydolnością nerek, przyjmujących inne preparaty potasu lub leki moczopędne oszczędzające potas należy liczyć się z koniecznością modyfikacji dawkowania zaleconą przez lekarza
- lek przechowywać w temperaturze pokojowej
- lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Lek **Magnokal Asparaginian** może wchodzić w interakcje z:

- antybiotykami z grupy tetracyklin oraz nitrofurantoiną
- glikozydami naparstnicy i powodować zaburzenia rytmu serca
- doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnych sulfonilomocznika)
- lekami moczopędnymi oszczędzających potas
- inhibitorami ACE

- lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi

Przechowywanie:

- w temperaturze nie wyższej niż 25oC
- chronić przed wilgocią
- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Emilii Plater 53

Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.