

## Magvit B6 48 mg+5 mg 50 tabletek dojelitowych



Cena: 21,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja  
czynna Magnesii lactas, Pyridoxinum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Magvit B6, 50 tabletek dojelitowych, podanie doustne

Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

(48 mg jonów magnezu+5 mg pirydoxyny chlorowodoru)

### Opis produktu:

Lek stosować w profilaktyce i leczeniu następstw niedoborów magnezu i (lub) witaminy B6.

### Skład:

- **Substancje czynne** - jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) oraz pirydoxyny chlorowodorek (witamina B6).
- **Substancje pomocnicze** - celuloza mikrokryształiczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemionka koloidalna uwodniona, talk, magnezu stearynian, kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, powidon K25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

### Wskazania:

- profilaktycznie stosuje się w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej

- w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu i w depresji nerwowej
- w bólach mięśni, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.
- jako uzupełnienie leczenia chorób serca i układu krążenia
- w terapii drżenia mięśni i drętwienia kończyn
- podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy
- wskazaniem do podawania Magvit B6 jest profilaktyka i leczenie następstw niedoborów magnezu i (lub) witaminy b6.

## Działanie:

- **Magnez** reguluje przepływ jonów w komórce - zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową. Współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca.
- **Witamina B6** ułatwia wchłanianie i transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie przez błony biologiczne do wnętrza komórek oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawidłowej wewnątrzkomórkowej puli magnezu

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Profilaktycznie

#### Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (młodzież):

- 1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę.
- lek należy popić wodą.

#### Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat:

- zgodnie z zaleceniami lekarza.

### Leczniczco

- Wyłącznie z przepisu lekarza.

#### 1 tabletką zawiera:

- jony magnezu - 48 mg (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego)
- pirydoksyny chlorowodorek - 5 mg (witamina B6)

#### 2 tabletki zawierają:

- jony magnezu - 96 mg (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego)

- pirydoksyny chlorowodorek - 10 mg (witamina B6)

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek.
- jeśli pacjent ma hipermagnezemię, hiperwitaminozę B6
- jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy
- jeśli pacjent ma myasthenia gravis
- jeśli pacjent ma parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy
- jeśli pacjent ma znaczne niedociśnienie tętnicze
- jeśli pacjent ma zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunkę.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Przy przestrzeganiu zalecanych dawek objawy niepożądane nie występują
- u niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Magvit b6 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- podczas stosowania doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a leku Magvit B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego.
- pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

### Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Magvit b6 może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

### Magvit B6 z jedzeniem i pić:

- nie należy stosować leku na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- nie stwierdzono ujemnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

#### Lek Magvit b6 zawiera:

- sacharozę.** Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za " wolny od sodu".

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- magnez zmniejsza wchłanianie teofiliny, tetracyklin, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy warfaryny.
- fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów, fityniany zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego
- leki moczopędne, cisplatyna, cykloseryna, mineralokortykosteroidy nasilają wydalanie magnezu z moczem.
- aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z preparatami magnezowymi mogą spowodować porażenie mięśniowe.
- witamina b6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi.
- stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy i doustnych środków antykoncepcyjnych prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na witaminą b6.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

ANGELINI PHARMA POLSKA SP.Z O.O. Aleje Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę

na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.