

Maść na odciski, (400 mg + 100 mg)/g, maść, 10g



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Acidum salicylicum, Acidum lacticum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Maść na odciski, (400 mg + 100 mg)/g, maść, 10g

(Acidum salicylicum + Acidum lacticum)

Opis produktu:

- Maść na odciski zawiera substancje czynne kwas salicylowy i kwas S-mlekowy oraz substancje pomocnicze - plaster nostrykowy i lanolinę.
- Lek po zastosowaniu na odcisk działa keratolitycznie (złuszczająco), zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie oraz działa miejscowo przeciwzapalnie.

Skład:

- **Substancjami czynnymi leku są:** kwas salicylowy, kwas (S)-mlekowy.
- **Pozostałe składniki leku to:** plaster nostrykowy, lanolina.

1 g maści zawiera 400 mg kwasu salicylowego i 100 mg kwasu (S)-mlekowego.

Wskazania do stosowania:

- Usuwanie odcisków.

Działanie:

- Lek po zastosowaniu na odcisk działa keratolitycznie (złuszczająco), zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie oraz działa miejscowo przeciwzapalnie.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Maść na odciski:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie, u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami krążenia, u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.
- Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmienną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W

razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na odciski.

- Odcisk wymoczyć i osuszyć. Nałożyć na odcisk cienką warstwę maści i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Stosować lek przez 4 do 6 dni rano i na noc, nie zmywając posmarowanych miejsc wodą.
- Następnie odcisk należy dobrze wymoczyć w gorącej wodzie i usunąć. Nie należy wycinać ani wrywać odcisków. W razie braku efektów powtórzyć leczenie po upływie 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść na odciski

- Przedawkowanie leku, zastosowanie na skórę wrażliwą lub uszkodzoną bądź nałożenie na błony śluzowe mogą doprowadzić do miejscowego uszkodzenia tkanek. W razie przypadkowego spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Maść na odciski

- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym dawkowaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.
- Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie i objawy nadwrażliwości skóry.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A., 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacje dodatkowe:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

