

Maxicortan krem 10mg/g krem 15 g



Cena: 15,89 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Hydrocortisonum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Maxicortan 10mg/g krem - 15 g

(Hydrocortisoni acetate)

Opis produktu:

Lek stosuje się miejscowo w stanach zapalnych

Skład:

- **substancją czynną jest** - hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetate)
- **substancje pomocnicze** - alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikolol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, makrogolu eter cetostearylowy, parafina ciekła, sorbitanu stearynian, wazelina biała, woda oczyszczona

1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu

Wskazania:

- atopowe zapalenie skóry
- wyprysk kontaktowy alergiczny

- pokrzywka
- reakcje występujące po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie)

Działanie:

- przeciwzapalne
- przeciwświądowe
- obkurczające naczynia krwionośne

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę
- cienką warstwę kremu nakładać na zmienioną chorobowo skórę 1 lub 2 razy na dobę
- nie stosować dłużej niż 7 dni bez zalecenia lekarza
- należy stosować zgodnie z miarą jednostki FTU (Jednostki opuszki palca). 1 FTU określa ilość kremu wyciśniętą z tuby w linii od czubka do fałdu pierwszego stawu palca wskazującego osoby dorosłej (~ 2,5 cm) co odpowiada 0,5 g kremu

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- jeśli pacjent ma uczulenie na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeśli u pacjenta występuje zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze.
- jeśli pacjent ma trądzik zwykły lub trądzik różowaty.
- jeśli u pacjenta występuje atrofia (zanik) skóry.
- Jeśli pacjent ma nowotwór skóry lub stan przednowotworowy skóry.
- jeśli u pacjenta występuje zapalenie skóry okolicy ust.
- jeśli u pacjenta występują zmiany gruźlicze skóry.
- jeśli pacjent ma otwarte rany i uszkodzoną skórę.
- na skórę twarzy
- lek Maxicortan nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane:

Długotrwałe stosowanie leku (przez okres dłuższy niż 14 dni), stosowanie na duże powierzchnie skóry lub pod opatrunkiem oraz u dzieci może spowodować wystąpienie następujących objawów niepożądanych:

- zanikowe zapalenie skóry, rozstępy na skórze
- nawrót zakażenia
- plamica posteroïdowa (przebarwienia i odbarwienia skóry)
- powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych
- trądzik
- zapalenie skóry w okolicy ust
- zapalenie skóry w okolicy oczu
- zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie
- opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń
- nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe
- wybroczyny (małe czerwone lub fioletowe plamki na skórze)
- podrażnienie skóry, takie jak pieczenie, zaczerwienienie
- nadmierna suchość, alergia kontaktowa
- jaskra lub zaćma w przypadku stosowania leku na skórę powiek
- zahamowanie czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza
- zespół Cushinga: zahamowanie wzrostu i rozwoju dzieci
- nadmiar cukru we krwi lub w moczu

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- nie są znane interakcje kremu Maxicortan z innymi lekami
- lek zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearynowy, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, alkohol cetylowy i alkohol stearynowy mogą powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza
- lek Maxicortan stosowany w dużych dawkach i na duże powierzchnie skóry może spowodować zaburzenia wzrostu i rozwoju dzieci oraz zahamowanie czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza (jest to nazwa układu współzależnych gruczołów wydzielania wewnętrznego, wytwarzających hormony)

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- nie należy stosować leku Maxicortan w okresie ciąży i karmienia piersią bez zalecenia lekarza. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w okresie ciąży lub karmienia piersią, lek powinien być stosowany ostrożnie, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.