

Maxipulmon syrop 3 mg/ml 120 ml



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Butamiratum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Maxipulmon, 3mg/ml - 120 ml syrop

(Butamirati citras)

Opis produktu:

Maxipulmon to lek w postaci syropu stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu różnego pochodzenia

Skład:

- **Substancja czynna** - butamiratu cytrynian
- **Substancje pomocnicze** - sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420), sukraloza (E 955), sodu chlorek, kwas benzoesowy (E 210), glicerol (E 422), sodu wodorotlenek, aromat malinowy AR 0320 (Himbeere fl. (mieszanka substancji aromatycznych i rozpuszczalnika), 3-cis-hexenol, glikol 1,2-propylenowy, wanilina), aromat waniliowy AR 0345 (dwuacetyl, etylu maślan, wanilina, glikol 1,2-propylenowy, woda), woda oczyszczona

1 ml syropu zawiera 3 mg butamiratu cytrynianu

Wskazania:

- lek przeznaczony jest do objawowego leczenia suchego kaszlu różnego pochodzenia

Działanie:

- działanie leku polega na ośrodkowym hamowaniu odruchu kaszlu

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat:

- 2,5 ml syropu 3 razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

- 5 ml syropu 3 razy na dobę

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 7,5 ml syropu 3 razy na dobę

Dorośli:

- 7,5 ml syropu 4 razy na dobę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Maxipulmon nie należy stosować:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u dzieci w wieku poniżej 3 lat
- u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 10 000):

- senność; nudności; biegunka; pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez cytrynian butamiratu, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych
- lek zawiera 2,18 mg glikolu propylenowego w 1 ml syropu
- lek zawiera 406 mg sorbitolu w 1 ml syropu. Wartość kaloryczna sorbitolu wynosi 2,6 kcal/g. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku. Sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające
- lek zawiera 6,21 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w 1 ml syropu. Odpowiada to 0,31% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.
- lek zawiera 0,58 mg kwasu benzoesowego w 1 ml syropu. Kwas benzoesowy może powodować miejscowe podrażnienie

Dzieci i młodzież:

- leku Maxipulmon nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- nie wolno stosować leku Maxipulmon w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek Maxipulmon może powodować senność, w związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn
- dzieci stosujące lek powinny unikać jazdy na rowerze i hulajnodze

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.