

# Maxon Active, 25 mg syldenafil, 8 tabletek powlekanych



Cena: 21,95 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Adamed
Substancja czynna	Sildenafilum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Maxon Active 25 mg - 8 tabletek powlekanych

#### (Sildenafilum)

Maxon Active to produkt stosowany do leczenia impotencji, czyli niemożności uzyskania lub utrzymania erekcji prącia, która wystarcza do odbycia stosunku płciowego.

#### Wskazania:

Lek Maxon Active 25 mg stosuje się u osób dorosłych w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji.

#### Działanie:

Lek zwiększa napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu.

#### Skład:

1 tabletkę zawiera:

**Substancję czynną:** 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu),

**Substancje pomocnicze:** celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, skład otoczkowy: Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

#### Dawkowanie:

Lek Maxon Active należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### Dorośli mężczyźni:

Zalecana dawka to 1 tabletkę (25 mg) na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.

- Nie stosować częściej niż raz na dobę.
- Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.
- Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
- Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, po wcześniejszym pobudzeniu seksualnym.

#### Przeciwwskazania:

Uczulenie na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

#### Maxon Active może wchodzić w interakcję z:

- lekami z grupy azotanów - stosowane w leczeniu bólów w klatce piersiowej (łączenie przeciwwskazane);
- lekami uwalniającymi tlenek azotu (łączenie przeciwwskazane);
- riocyguatem (łączenie przeciwwskazane);
- inhibitorami proteazy stosowanymi w leczeniu HIV (zaleca się rozpoczęcie od niższej dawki sildenafilu);
- lekami alfa-adrenolitycznymi (zaleca się odpowiedni odstęp między lekami).

#### Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku tekturowym po EXP:.. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

#### Działania niepożądane:

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Maxon Active są zwykle krótkotrwałe, łagodnie lub umiarkowanie nasilone. Lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxon Active i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:**

- **reakcja alergiczna** - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów) Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła;
- **bóle w klatce piersiowej** - występują niezbyt często Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim: należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;
- **nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody** - występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
- nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko;
- ciężkie reakcje skórne - występują rzadko;
- objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę;
- napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko.

**Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów);**

- ból głowy.

**Często (może występować u 1 na 10 pacjentów):**

- nudności,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
- niestrawność,
- zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia),
- uczucie zatkanego nosa,
- zawroty głowy.

**Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów):**

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oka,
- przekrwienie oczu,
- ból oczu,

- widzenie błysków światła,
- jaskrawe widzenie,
- wrażliwość na światło,
- łzawienie oczu,
- zapalenie spojówek,
- kołatanie serca,
- szybkie bicie serca,
- nadciśnienie tętnicze,
- niedociśnienie,
- bóle mięśni,
- senność,
- osłabione czucie dotyku,
- zawroty głowy,
- dzwonięcie w uszach,
- suchość w jamie ustnej,
- zatkanie lub niedrożne zatoki,
- nieżyt nosa,
- nadwrażliwość,
- zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos),
- ból w górnej części brzucha,
- choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę),
- krew w moczu,
- ból rąk lub nóg,
- krwawienie z nosa,
- uczucie gorąca,
- uczucie zmęczenia.

**Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów):**

- udar naczyniowy mózgu,
- przemijający napad niedokrwienny,

- drgawki, drgawki nawracające,
- omdlenie,
- przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego niezwiązana z zapaleniem tętnic (NAION),
- zamknięcie naczyń siatkówki,
- krwotok siatkówkowy,
- retinopatia miażdżycowa,
- zaburzenia siatkówki,
- jaskra,
- ubytki pola widzenia,
- widzenie podwójne,
- zmniejszona ostrość widzenia,
- krótkowzroczność,
- nieomoga widzenia,
- zmętnienie ciała szklanego,
- zaburzenie tęczówki,
- rozszerzenie źrenicy,
- widzenie obwódok wokół źródeł światła (ang. halo vision),
- obrzęk oka, obrzmienie oka,
- zaburzenia oka, przekrwienie spojówek,
- podrażnienie oka,
- nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka,
- obrzęk powieki,
- odbarwienie twardówki,
- utrata słuchu,
- nagła śmierć sercowa,
- zawał mięśnia sercowego,
- arytmia komorowa,
- migotanie przedsionków,
- niestabilna dławica,

- uczucie ucisku w gardle,
- obrzęk nosa,
- suchość nosa,
- niedoczulica jamy ustnej,
- Zespół Stevensa-Johnsona,
- martwica toksyczna naskórka,
- krwawienie z prącia, priapizm, krwawa sperma,
- nasiloną erekcja,
- drażliwość.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

#### Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie bądź ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Lek Maxon Active może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Maxon Active oraz godzinie jego zażycia.
- Nie należy przyjmować leku Maxon Active jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.
- Nie należy stosować leku Maxon Active, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej).
- Nie należy stosować leku Maxon Active, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
- Jeśli pacjent już przyjmuje riociguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
- W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku Maxon Active. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy, lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Maxon Active i leki alfa-adrenolityczne. Ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Maxon Active. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfaadrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Maxon Active. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku Maxon Active. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomoc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha, krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania.

#### Stosowanie leku Maxon Active z jedzeniem, pić i alkoholem:

Lek Maxon Active może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Maxon Active

w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxon Active, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed zażyciem leku należy skorzystać z dołączonego narzędzia diagnostycznego (ankieta) w celu oceny, czy stosowanie przez pacjenta produktu leczniczego jest właściwe.
- W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego, należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w celu rozpoznania zaburzenia erekcji i określenia jego przyczyn.
- Jeśli wystąpi nagle pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Leku nie należy stosować równoległe z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzrodu.
- Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.
- Nie należy przyjmować leku, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
- Lek nie powinien być stosowany u mężczyzn z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
- Nie należy przyjmować tabletek powlekanych Maxon Forte jednocześnie z innymi lekami zawierającymi sildenafil (np. Viagra).
- Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
- Nie należy zażywać większej liczby tabletek, niż wskazano w ulotce dla pacjenta. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku Maxon Forte u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. Należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

#### Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxon Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego);
- jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego;
- dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
- choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).

#### Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

- Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza.
- Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni stosować leku Maxon Forte w dawce wyższej niż 25 mg.

#### Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

- Produkt Maxon Active nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

**Dzieci i młodzież:**

- Leku Maxon Active nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

**Dodatkowe informacje:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., ul. M. Adamkiewicza 6A, Pierńków, 05-152 Czosnów.