

Mensil tabletki do rozgryzania i żucia 25mg 8 tabletek

Cena: 24,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Sildenafilum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Mensil 25 mg, 8 tabletek do rozgryzania i żucia

(Sildenafilum)

Mensil to produkt leczniczy stosowany w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn.

Działanie leku **Mensil** polega na zwiększaniu napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Skład:

- **substancję czynną:** sylденаfil
- **pozostałe składniki:** polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Jedna tabletką leku zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Wskazania:

Leczenie zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn.

Działanie:

Mensil zawiera substancję czynną sildenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).

- lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.
- Sildenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **zalecana dawka leku Mensil to 25 mg.**
- lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.
- **leku Mensil nie należy stosować częściej niż raz na dobę.**
- lek Mensil należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
- tabletkę należy rozgryźć i żuć.
- tabletki nie wymagają popijania.

Przeciwwskazania:

- uczulenie na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeśli pacjent przyjmuje azotany, leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers) oraz riocyguat.
- ciężkie choroby serca i wątroby.
- niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz niskie ciśnienie tętnicze krwi.
- dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa).
- stwierdzona kiedykolwiek utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).

Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

- nudności, zawroty głowy,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
- niestrawność
- widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie,
- bóle mięśni,
- senność, osłabione czucie dotyku,
- dzwonięcie w uszach, suchość w jamie ustnej,
- zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatknięty nos), ból w górnej części brzucha,
- krew w moczu,
- ból rąk lub nóg,
- krwawienie z nosa,
- uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

- omdlenia,
- udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
- uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
- krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódok wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
- krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
- suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości
- nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:

- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej
- zasięgnąć pomocy medycznej

Nie należy przyjmować leku Mensil razem z innymi lekami zawierającymi sildenafil.

Stosowanie leku z jedzeniem, pić oraz alkoholem:

- lek Mensil może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Mensil w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.
- zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

- lek Mensil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- lek Mensil może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia.
- pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Mensil.

Dzieci i młodzież:

- leku Mensil nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- lek Mensil zawiera laktozę.
- lek Mensil zawiera 2,15 mg aspartamu (E 951) w jednej tabletkie.
- należy skorzystać z dołączonej instrukcji dla pacjenta oraz zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mensil należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku:

- niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
- jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
- dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże

się z aktywnością seksualną.

- choroby wrzodowej lub przy zaburzeniach krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia).
- jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Mensil i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- leku Mensil nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzrodu.
- leku Mensil nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z
- zastosowaniem sylденаfilu ani innymi inhibitorami PDE5.
- leku Mensil nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Opakowanie zawiera 8 tabletek do rozgryzania i żucia

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek, ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.