

Metafen, Forte, żel, przeciwbólowy, przeciwzapalny, 100 g



Cena: 22,59 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polpharma

Substancja
czynna Ibuprofenum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Metafen żel Forte (100 mg/g) żel 100 g

(Ibuprofenum lysinum)

Opis produktu:

Metafen żel Forte to lek w postaci żelu o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, do stosowania miejscowego. Substancją czynną w żelu jest ibuprofen, należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Skład:

- **Substancja czynna** - ibuprofen, w postaci soli lizynowej ibuprofenu (Ibuprofenum lysinum).
- **Substancje pomocnicze** - makrogol 200, trolamina, karbomer 980, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, olejek z pomarańczy gorzkiej, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 100 mg soli lizynowej ibuprofenu.

Wskazania:

Wskazaniami do stosowania **Metafen żel Forte** są schorzenia wymagające miejscowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego:

- bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego;
- bóle pleców;
- nerwobóle;
- bóle pourazowe;
- bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

Działanie:

- **Metafen żel Forte** zawiera ibuprofen, który należy do grupy leków nazywanej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) i wykazuje działanie przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Mechanizm działania ibuprofenu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w tkankach, które towarzyszą stanowi zapalnemu.

Dawkowanie:

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek podaje się miejscowo na skórę.
- Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku **powyżej 12 lat**:
- Porcję żelu, pasek o długości ok. 3 cm, wycisnąć na miejsce objęte dolegliwościami i następnie masować aż **Metafen żel Forte** całkowicie wchłonie się.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki, czyli nie stosować częściej niż co 4 godziny do 3 razy na dobę, ale nie dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli w ciągu tego okresu czasu dolegliwości nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Metafen żel Forte**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen czy inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- przy chorobach alergicznych skóry;
- jeśli pacjent cierpi na choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi;
- na oparzenia skóry, uszkodzenia skóry;
- jeśli w przeszłości występował u pacjenta skurcz oskrzeli, nieżyt nosa w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego czy innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, **Metafen żel Forte** może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność.

- Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, niestrawność.
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki różnego rodzaju, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadziej).
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku, niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne.
- Podczas leczenia ibuprofenem może pojawić się uszkodzenie nerek, zwłaszcza u pacjentów z chorobami tego narządu.

Podczas długotrwałego stosowania na duże powierzchnie mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, zmiany w obrazie krwi (granulocytopenia, agranulocytoza), hiperurykemia oraz objawy dotyczące przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, utrata łaknienia, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje ibuprofenu podanego miejscowo z innymi lekami, ale ze względu na fakt, iż występują one przy podaniu doustnym to nie można ich wykluczyć.

- Stosowanie razem z kwasem acetylosalicylowym i innymi NLPZ może spowodować częstsze występowanie działań niepożądanych.
- Ibuprofen podany doustnie może wchodzić w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.
- Ibuprofen połączony z kwasem acetylosalicylowym może nieodwracalnie znosić efekt hamowania agregacji, a przez to jego ochronny wpływ na serce u osób z ryzykiem zawału zostaje ograniczony.
- Łączenie NLPZ z kortykosteroidami może zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej przewodu pokarmowego.
- U pacjentów zażywających leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol) albo czynniki trombolityczne (np. streptokinaza) ibuprofen może hamować agregację płytek krwi, co może w konsekwencji powodować krwawienia z przewodu pokarmowego i wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.
- Ibuprofen zwiększa toksyczne działanie metotreksatu, zmniejsza działanie leków moczopędnych oraz zwiększa stężenie podawanego litu w osoczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność jeśli pacjent:

- posiada zaburzenia czynności wątroby lub nerek oraz z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
- choruje na astmę i wcześniej nie stosował kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NPLZ - należy wcześniej skonsultować się z lekarzem;
- cierpi na dolegliwości przewodu pokarmowego - ibuprofen stosowany na skórę może także (choć ryzyko jest znacznie mniejszym) powodować działania niepożądane związane z przewodem pokarmowym, więc przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem,
- cierpi na choroby nerek - podczas miejscowego stosowania **Metafen żel Forte** ibuprofen także przedostaje się do krwi (choć w znacznie mniejszej ilości niż przy podaniu doustnym) i może pogorszyć się istniejąca niewydolność nerek, więc przed użyciem

zaleca się skonsultowanie z lekarzem.

- Chronić oczy i błony śluzowe przed **Metafen żel Forte**,
- Unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne obszaru leczonego ze względu na możliwość wystąpienia reakcji fototoksycznej,
- Jeśli pojawią się zmiany skórne w miejscu stosowania należy odstawić **Metafen żel Forte**,
- Przy długotrwałym wmasowywaniu preparatu założyć rękawiczki ochronne,
- Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że leczenie dotyczy właśnie rąk.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież:

- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża, karmienie piersią:

- W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., .ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

