

## Metafen rozkurczowy 40 mg, 40 tabletek



Cena: 15,40 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Drotaverinum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Metafen rozkurczowy 40 mg - 40 tabletek

(Drotaverini hydrochloridum)

### Opis produktu:

Metafen Rozkurczowy zawiera drotawerynę, która działa spazmolitycznie (rozkurczowo) na mięśnie gładkie. Stosowany w stanach skurczowych w przebiegu chorób układu pokarmowego i moczowo-płciowego oraz w bolesnym miesiączkowaniu.

### Skład:

- Substancja czynna - drotaweryny chlorowodorek.
- Substancje pomocnicze - celuloza mikrokryształiczna, krospowidon, magnezu stearynian.

1 tabletkę zawiera 40 mg chlorowodoru drotaweryny.

### Wskazania:

- Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,

zapalenie pęcherzyka żółciowego.

- **Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych:** kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
- **Wspomagająco:** w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole drażliwego jelita grubego, w zaparciach spastycznych i wzdęciach jelit;
- **w bolesnym miesiączkowaniu.**

## Działanie:

- Rozkurczowe przy skurczowych bólach brzucha.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli** - 120 mg do 240 mg (4 do 8 tabletek) na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową wynosi 240 mg (8 tabletek).

**Dzieci** - W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego Metafen rozkurczowy u dzieci:

- **dawka dobową dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat** - wynosi 80 mg (2 tabletki), w 2 dawkach podzielonych.
- **dawka dobową dla dzieci w wieku powyżej 12 lat** - wynosi 160 mg (4 tabletki), w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 10 dni.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek.
- Nie stosować jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Nie stosować leku w czasie porodu.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):**

- bóle i zawroty głowy, bezsenność,

- nudności, utrata łaknienia, zaparcia,
- po dużych dawkach - senność, osłabienie,
- obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca,
- reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

**Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):**

- krwawienie poporodowe.

**Interakcje:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Jednoczesne stosowanie z produktami zawierającymi lewodopę zmniejsza skuteczność ich działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Przed zastosowaniem leku Metafen rozkurczowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma porfirię,
- jeśli pacjent ma niedociśnienie,
- u dzieci,
- u kobiet w ciąży.

**Dzieci i młodzież:**

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

**Ciąża, karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Lek można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie stosować leku w czasie porodu i w okresie karmienia piersią.

**Płodność:**

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy należy zachować ostrożność.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, .ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.