

Mucofortin 600mg 10 tabletek musujących



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Natur produkt
Substancja czynna	Acetylcysteinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Mucofortin, 600 mg - 10 tabletek musujących

(Acetylcysteinum)

Opis produktu:

Mucofortin to produkt leczniczy do stosowania w kaszlu mokrym, z zalegającą wydzieliną towarzyszący np. przeziębieniu

Skład:

- **Substancją czynną jest** - acetylocysteina (Acetylcysteinum)
- **Substancje pomocnicze** - kwas cytrynowy bezwodny, izomalt, sodu wodorowęglan, kwas askorbowy, aspartam (E 951), aromat cytrynowy

Wskazania:

- objawy zakażenia związane z przeziębieniem

Działanie:

- rozrzedza wydzielinę
- ułatwia odkrztuszanie

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dorośli:

- 1 tabletkę musującą (600 mg) raz na dobę
- lek należy przyjmować po jedzeniu

Sposób przygotowania:

- 1 tabletkę rozpuścić w 1 szklanki wody i wypić po rozpuszczeniu
- gotowego roztworu nie należy mieszać z innymi lekami
- **nie stosować dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem**
- lek najpóźniej należy stosować na 4 godziny przed snem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Mucofortin:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma stan astmatyczny (duszność w przebiegu astmy oskrzelowej lub obturacyjnej choroby płuc)
- jeśli stwierdzono u pacjenta fenyloketonurię
- u dzieci poniżej 2 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób):

- reakcje nadwrażliwości, ból głowy, szumy uszne, zwiększona częstość pracy serca (tachykardia), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, biegunka, ból brzucha, nudności, zmiany skórne: pokrzywka, wysypka, swędzenie, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, zmniejszone ciśnienie krwi

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób):

- skurcz oskrzeli, duszność, niestrawność

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomo-anafilaktyczna), krwotok

Działania niepożądane występujące częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- obrzęk twarzy

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- nie należy stosować leku Mucofortin z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż osłabiają one odruch kaszlowy i mogą utrudnić odkrztuszenie rozrzedzonej przez lek wydzieliny
- Acetylocysteina (substancja czynna leku) może osłabiać działanie niektórych antybiotyków, zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn i aminoglikozydów. Aby temu zapobiec, lek należy przyjmować po 2 godzinach od zażycia antybiotyku. Nie dotyczy to takich antybiotyków, jak amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol oraz cefuroksym. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza
- Mucofortin może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów (leków stosowanych w chorobach układu krążenia i w chorobie niedokrwiennej serca). Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem tego leku
- węgiel aktywny może osłabiać działanie leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku omówić z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- astmy oskrzelowej, pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), jeśli w przeszłości występowała niewydolność oddechowa, w przeszłości występowała choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, jeśli pacjent jest uczulony na histaminę
- w przypadku wystąpienia zmian na skórze / błonach śluzowych, stosowanie leku należy przerwać i skontaktować się z lekarzem
- lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią
- lek zawiera izomalt (substancja słodząca) - w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów, stosowanie leku omówić z lekarzem
- lek jest źródłem sodu, co należy wziąć pod uwagę u osób z osłabioną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących jego ilość w diecie (dieta bezsolna lub ubogosodowa)

Ciąża i karmienie piersią:

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Wpływ na badania laboratoryjne:

- lek może wpływać na oznaczanie salicylanów i ketonów w moczu

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u osób poniżej 18 lat

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
- Nie stosować leku po upływie 28 dni od pierwszego otwarcia pojemnika

Podmiot odpowiedzialny:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.