

Mucosolvan Mini syrop 15mg/5ml, 100 ml

Cena: 22,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Sanofi
Substancja czynna	Ambroxolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Mucosolvan Mini 15 mg/ 5 ml, syrop dla dzieci powyżej 1 roku, smak owoców leśnych - 100 ml

Opis produktu:

Mucosolvan Mini to lek w postaci syropu dla dzieci powyżej 1. roku życia. Jego substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek, która zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, tym samym ułatwiając odkrztuszanie i łagodząc kaszel. Syrop Mucosolvan przeznaczony jest do stosowania w przypadku ostrej i przewlekłej choroby płuc oraz oskrzeli, przebiegającej z zaburzeniem wydzielania śluzu i utrudnieniem jego transportu.

Skład:

- Substancją czynną leku jest: ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, sorbitol ciekły niekryształizujący, glicerol 85%, kwas benzoesowy, acesulfam potasowy, aromat owoców leśnych PHL 132195, aromat waniliowy 201629, woda oczyszczona.

5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

Wskazania:

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Działanie:

- ułatwia odkaszczanie,
- oczyszcza drogi oddechowe,
- przywraca naturalną ochronę,
- łagodzi kaszel,
- rozrzedza wydzielinę,
- zmniejsza ból gardła i jego zaczerwienienie.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat:** 20 ml 2 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku od 6. do 12. lat:** 10 ml 2-3 razy na dobę.
- **Dzieci od 2. do 6. lat:** 5 ml 3 razy na dobę.
- **Dzieci od 1. roku do 2. lat:** 5 ml 2 razy na dobę.

Produktu nie należy podawać przed snem.

Jeżeli podczas stosowania leku Mucosolvan Mini w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Mucosolvan Mini jest uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób):

- nudności,
- uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej języka i gardła (zmniejszenie czucia w jamie ustnej i gardle)
- zmiana w odczuwaniu smaku (zaburzenia smaku).

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):

- biegunka,
- niestrawność,
- ból brzucha (ból w nadbrzuszu),
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- wymioty.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

- reakcje nadwrażliwości,
- wysypka,
- pokrzywka.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i świąd,
- ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica),
- suchość w gardle.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub ciężką niewydolność wątroby, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku.
- Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować leku przed snem.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ambroksolu chlorowodorek przenika przez barierę łożyskową. Badania przedkliniczne nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania ambroksolu chlorowodorku.

- Ambroksolu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania ambroksolu chlorowodoru u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci bez porozumienia się z lekarzem.

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Ambroksol powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków (amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna) w wydzielinie oskrzelowo-płucnej oraz płwocinie.
- Leku Mucosolvan Mini nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeina), ponieważ może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej wskutek osłabionego odruchu kaszlowego. Leki przeciwkaszlowe poprzez hamowanie odruchu kaszlowego utrudniają odkrztuszanie upłynnionego śluzu.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.