

# Nalewka Gorzka, niestrawność, brak łaknienia płyn doustny 35 ml



Cena: 7,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Amara tinctura
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Nalewka gorzka płyn doustny - 35 g

## (Amara tinctura)

## Opis:

Nalewka Gorzka (Tinctura Amara) to tradycyjny produkt leczniczy, który stosuje się doraźnie w celu pobudzenia łaknienia

## Skład:

1 ml [co odpowiada 0,91 g] płynu doustnego zawiera:

- tinctura (nalewka gorzka) - nalewka złożona (1:5) z *Gentiana lutea* L., *radix* (korzeń goryczki) *Menyanthes trifoliata* L., *folium* (liść bobrka), *Citrus aurantium* L., ssp. *aurantium*, *epicarpium* et *mesocarpium* (owocnia pomarańczy gorzkiej) (60/60/50), ekstrahent: etanol 70% (V/V)

Produkt zawiera 63 -70% (V/V) etanolu

1 butelka z kroplomierzem 35ml

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

**Dorośli:**

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

- w niestrawności jednorazowo ok. 0,6 ml (10 - 12 kropli) nalewki
- w braku łaknienia ok. 0,6 ml (10 -12 kropli) nalewki stosować 30 min. przed posiłkiem 3 razy na dobę, maksymalnie do 6 razy

**Dzieci i młodzież:**

- leku nie stosować u dzieci i młodzieży

**Sposób podawania:**

- lek przeznaczony jest do podawania doustnego

## Wskazania:

- produkt tradycyjnie stosowany pomocniczo w **braku łaknienia, niestrawności**

## Działanie:

- **Nalewka Gorzka** działa wspomagająco w celu pobudzenia łaknienia

## Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną
- nie stosować w stanach zapalnych żołądka i dwunastnicy, chorobie wrzodowej, nadkwaśności

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- możliwe wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, bólów głowy
- częstość tych działań jest nieznaną
- w rzadkich przypadkach może wystąpić tachykardia, świąd oraz nadwrażliwość na światło

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- w przypadku bólu brzucha niewiadomego pochodzenia zaleca się zasięgnąć porady lekarza
- produkt leczniczy zawiera 63-70% (V/V) etanolu tzn. do 304 mg na dawkę (dawka jednorazowa to 0,55 ml płynu)
- lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat

### Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- produkt leczniczy jest niezalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- w czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn

## Stosowanie innych leków:

- należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować

## Przechowywanie:

- w temperaturze nie wyższej niż 25oC
- przechowywać w zamkniętej butelce
- chronić od światła
- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

## Podmiot odpowiedzialny:

Amara Stacyjna 5 Kraków

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.