

Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus aerozol do nosa 15 ml

Cena: 28,59 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	P&G Health Germany
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Nasivin Aloes i Eukaliptus, aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml - 15 ml

(Oxymetazolini hydrochloridum)

Opis produktu:

- Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus to lek w postaci aerozolu stosowanego do nosa, który łagodzi objawy niedrożności nosa, towarzyszące przeziębieniu albo zapaleniu błony śluzowej nosa.
- produkt leczniczy może być stosowany do krótkotrwałego leczenia dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych

Skład:

- Substancja czynna - chlorowodorek oksymetazolininy
- Substancje pomocnicze - sorbitol (E 420) sodu cytrynian (do wyrównania pH) (E 331) polisorbit 80 alkohol benzylový kwas cytrynowy bezwodny (do wyrównania pH) (E 330) suchy wyciąg z aloesu, benzalkoniowy chlorek, roztwór, lewomentol, acesulfam potasowy (E 950), cyneol, L-Karwon, disodu edetynian, woda oczyszczona

1 dawka aerozolu (50 µl) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodoru

Wskazania:

- krótkotrwałe leczenie objawów niedrożności nosa w przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa

Działanie:

- **Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus** zawiera oksymetazolinę, która powoduje zwężenie naczyń w błonie śluzowej nosa, co skutkuje zmniejszeniem przekrwienia i udrożnieniem nosa

efekt działania leku pojawia się już po kilku minutach i utrzymuje się przez 12 godzin

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

- 1-2 dawki aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat:

- 1 dawka aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat – nie stosować

Nie należy przekraczać zalecanej dawki

Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni z rzędu. Jeśli **Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus** stosowany jest dłużej, może powodować uczucie zatkanego nosa

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, chlorowodorek oksymetazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent stosuje (bądź stosował w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitory monoaminoooksydazy (inhibitory MAO stosowane są w leczeniu choroby Parkinsona i depresji)
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub duszność w przebiegu niewydolności serca

- jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączania)
- jeśli pacjent miał zabieg usunięcia przysadki
- jeśli pacjent ma zapalenie skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa, lub ma strupy w nosie

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- kichanie, suchość i podrażnienie w nosie, jamie ustnej lub gardle

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- niepokój, zmęczenie, rozdrażnienie, zaburzenia snu, przyspieszony rytm serca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, zatłokany nos, obrzęk błony śluzowej nosa, ból głowy, nudności, rumieńce, wysypka i zaburzenia widzenia

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- inhibitory monoaminoooksydazy (IMAO) stosowane w leczeniu choroby Parkinsona i depresji. Nie należy stosować leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus, jeśli inhibitory MAO przyjmowane były w ciągu ostatnich dwóch tygodni
- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków stosowanych w leczeniu depresji, takich jak amitryptylina i imipramina
- beta-adrenolityki lub leki stosowane podczas leczenia wysokiego ciśnienia krwi – należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jakiegokolwiek leki z tej grupy
- leki stosowane w chorobie Parkinsona (bromokryptyna) – przed zastosowaniem leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus należy poinformować lekarza o przyjmowaniu takich leków

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent:

- ma wysokie ciśnienie krwi, MAT+SE/H/0196/IB/043 Business Use
- ma chorobę serca, w tym dławicę piersiową
- ma cukrzycę
- ma zaburzoną czynność tarczycy
- lek zawiera 0,01 mg benzalkoniowego chlorku w każdej dawce aerozolu, co odpowiada 0,2 mg/ml. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego stosowania
- nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu

Dzieci i młodzież:

- nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Ciąża, karmienie piersią:

-

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

-

decyzję o stosowaniu leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, podejmuje lekarz

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia

Podmiot odpowiedzialny:

P&G Health Germany GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.