

## Nasometin Control aerozol do nosa 120 dawek



Cena: 37,70 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Sandoz
Substancja czynna	Mometasonum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

## Nasometin Contol aerozol do nosa zawiesina - 120 dawek

(Mometasoni furoas 50 mikrogramów/dawkę)

### Opis produktu:

Aerozol do nosa **Nasometin Control** to lek łagodzący objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, nazwanego także katarzem siennym.

### Skład:

Substancją czynną jest:

- 50 mikrogram - mometazonu furoinianu

substancje pomocnicze:

- benzalkoniowy chlorek, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu

cytrynian, woda oczyszczona

1 dawka leku dostarcza 50 mikrogramów mometazonu furoinianu

## Wskazania:

- lek stosuje się przy nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej (występującym przy katarze siennym oraz w alergicznym nieżycie nosa).
- alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u osób dorosłych

## Działanie:

- łagodzi objawy zapalenia (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli w wieku od 18 lat:** Zalecaną dawką są dwa rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę
- przed zastosowaniem pierwszej dawki należy mocno wstrząsnąć butelką i rozpylić lek 10-krotnie (aż do uzyskania jednorodnego aerozolu). Jeśli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, należy sprawdzić jej działanie przed kolejnym użyciem przez dwukrotne rozpylenie leku, do uzyskania jednorodnego aerozolu
- okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 2 miesiące

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest uczulenie na furonian memetazonu albo którykolwiek z pozostałych składników
- leku nie należy stosować u osób z niewyleczonym zakażeniem nosa oraz u osób po niedawno przeżytym zabiegu chirurgicznym w okolicach nosa czy po jego urazie
- stosowanie leku w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu wyleczenia zakażenia.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):**

- ból głowy, kichanie, krwawienie z nosa, ból nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa, zakażenie dróg oddechowych

**Częstość nieznaną:**

- zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra) i/lub zaćma powodujące zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, uszkodzenie błony śluzowej nosa, zmiana smaku i węchu, trudności w oddychaniu i/lub świszczący oddech

**Interakcje:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- w przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku
- u niektórych pacjentów po przerwaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów.
- niektóre leki mogą nasilić działanie leku i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.
- jeśli u pacjenta występuje jakiegokolwiek inne zakażenie.
- jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.
- jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza
- należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia
- jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, mogą wystąpić działania niepożądane z powodu wchłaniania się leku w organizmie
- lek Nasometin Control zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas

**Ciąża i karmienie piersią:**

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania mometazonu furoinianu u kobiet w ciąży.
- nie wiadomo, czy mometazonu furoinianu przenika do mleka ludzkiego

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

- leku **Nasometin Control** nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

- brak danych dotyczących wpływu mometazonu furoinianu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Sandoz Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 50c 02-672 Warszawa

**Dodatkowe informacje:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.**