

Neo Angin z cukrem, tabletki na ból gardła, 24 tabletki do ssania



Cena: 21,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Dichlorobenzyl alcohol, Amylmetacresolum, Mentholum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Neo-angin, 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg, 24 tabletki do ssania

(Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum)

Skład:

Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol.

Jedna tabletki do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4- dichlorobenzylicus), 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum) i 5,9 mg lewomentolu (Levomentholum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna tabletki do ssania zawiera 1,14 g glukozy (sucha masa), 1,42 g sacharozy oraz 0,35 mg czerwieni koszenilowej A (E 124),

Pozostałe substancje pomocnicze: Olejek z anyżu gwiazdowego, Olejek miętowy, Kwas winowy.

Wskazania:

- Produkt Neo-angin jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Działanie:

- Neo-angin to lek w postaci tabletek do ssania, zawiera dwie substancje czynne (alkohol 2,4- dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu antyseptycznym oraz lewomentol, który wywołuje uczucie chłodu na błonach śluzowych. Jednoczesne stosowanie substancji czynnych w leku Neo-angin powoduje ustąpienie bólu gardła i trudności w przełykaniu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

- Powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.
- Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.
- Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.
- Pacjent nie powinien przyjmować produktu dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania:

Nie należy przyjmować leku w przypadku:

- Nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nietolerancji fruktozy.
- Zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.
- Niedoboru sacharazy-izomaltazy.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu produktu Neo-angin obserwowano następujące działania niepożądane:

- **Bardzo rzadko (**