

Neo-Capsiderm maść 30 g



Cena: 12,20 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna -

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Neo-Capsiderm, maść, 30g

Lek przeznaczony dla dorosłych

NeoCapsiderm to maść rozgrzewająca i energetyzująca.

Zawiera wyciąg z pieprzowca, kamforę oraz olejki eteryczne przywracające naturalne, stopniowe i długotrwałe uczucie ciepła.

NeoCapsiderm charakteryzuje się intensywnym, odświeżającym zapachem, utrzymującym się na skórze po aplikacji. Dzięki odpowiedniej konsystencji maść dobrze się rozprowadza i łatwo wmasowuje. Efekt aplikacji jest trwały i nie ulega zmianie w trakcie stosowania.

Skład:

- Substancją czynną leku jest - noniwamid, kamfora,olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej, olejek eukaliptusowy.
- Substancje pomocnicze - lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina biała.

100 g maści zawiera:

- noniwamid (Nonivamidum) - 0,05 g
- kamfora (Camphora) - 5,3 g
- olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro) - 9,7 g

- olejek eukaliptusowy (*Eucalypti aetheroleum*) - 2,5 g

Wskazania:

- masaż i terapie manualne
- rozgrzewanie mięśni przed aktywnością fizyczną
- łagodzenie napięcia mięśniowego po intensywnym wysiłku
- u osób starszych z problemami układu mięśniowego i stawowego
- u osób aktywnych fizycznie oraz uprawiających sport
- u osób pracujących fizycznie, które mogą doświadczać zmęczenia mięśni

Działanie:

- łagodzące dyskomfort towarzyszący bólowi mięśni, stawów i kręgosłupa
- rozgrzewające, energetyzujące i rozluźniające mięśnie
- pomaga likwidować zakwasy i eliminuje symptomy zmęczenia
- daje uczucie przyjemnego odprężenia w trakcie masażu

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować zewnętrznie na skórę

Dorośli: niewielka ilość maści wmasowywana w miejsca bolące od 1 do 2 razy dziennie, nie dłużej niż przez okres 2 dni.

- należy zachować 4-godzinny odstęp czasowy między kolejnymi aplikacjami.
- ponowna terapia lekiem na to samo miejsce możliwa jest dopiero po przynajmniej 14-dniowej przerwie.
- po naniesieniu maści starannie umyć ręce, nie dotykać oczu ani błon śluzowych.
- po dłuższym stosowaniu maści na to samo miejsce możliwe jest uszkodzenie nerwów czuciowych.

Dzieci i młodzież: nie stosować leku neo-capsidem u dzieci i młodzieży

- po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostały na dłoniach lek.
- na początku terapii można odczuwać mrowienie, pieczenie, w żadnym wypadku nie należy brać gorącej kąpieli przed lub po nałożeniu leku, gdyż może to pogłębić odczucie mrowienia, pieczenia.
- w przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie leku, zaleca się przemyć skórę wodą utlenioną i skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

- nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego
- nie stosować leku u dzieci i młodzieży
- nie stosować na uszkodzoną skórę
- nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (w szczególności na noniwamid) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na przetwory z pieprzowca
- w przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących się powstaniem wysięków lub wysypki, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- w niektórych przypadkach mogą wystąpić odczyny uczuleniowe (wykwit pokrzywkowy).
- w przypadku utrzymywania się odczynu uczuleniowego, po zaprzestaniu stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- brak dostępnych danych dotyczących interakcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ciąża i karmienie piersią

- ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować leku w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Lek Neo-Capsiderm zawiera lanolinę

- lanolina może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe)

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań,

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.