

# Neomycini 5 mg/g, maść przeciwbakteryjna, ropne choroby skóry, oparzenia odmrożenia z zakażeniem, 5g



Cena: 16,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Chema
Substancja czynna	Neomycinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Unguentum Neomycini, (5 mg/g), maść, 5 g

(Neomycinum)

## Opis produktu:

Unguentum Neomycini to produkt leczniczy do stosowania w ropnych chorobach skóry, oparzeniach i odmrożeniach z zakażeniem.

## Skład:

- Substancją czynną leku jest siarczan neomycyny (Neomycini sulfas).

1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny.

- Pozostałe składniki: wazelina biała, parafina ciekła.

## Wskazania:

- ropne choroby skóry (zwłaszcza wywołane przez gronkowce - czyraczność, liszajec gronkowcowy),

- ropne powikłania chorób alergicznych skóry,
- zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia.

## Działanie:

- **Unguentum Neomycini** wykazuje działanie przeciwbakteryjne (bakteriobójcze) przeciw bakteriom Gram-ujemnym (*Escherichia coli*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Salmonella*, *Shigella*), prątkom kwasoopornym.

Nie działa na grzyby, drożdże, wirusy.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Zmienione chorobowo miejsce pokryć cienką warstwą maści 2-4 razy na dobę.
- Nie stosować dłużej niż 7 dni.
- Po zastosowaniu leku, umyć ręce.

## Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Nie należy stosować leku:

- w przypadku uszkodzenia słuchu,
- u osób w podeszłym wieku, niewydolności nerek, chorobach narządu słuchu, zaburzeniach słuchu lub równowagi w wywiadzie (ryzyko działania ototoksycznego),
- u dzieci poniżej 12 lat,
- na duże powierzchnie ciała, na sączące się zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe,
- nie stosować długotrwale,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- z innymi lekami ototoksycznymi, nefrotoksycznymi i neurotoksycznymi.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- odczynny i podrażnienia skórne,
- zmiany alergiczne,

- zaczerwienienie, rumień,
- obrzęk, świąd,
- odczyny toksyczne,
- zmiany o charakterze wypryskowym

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować leku przez dłuższy czas (ryzyko oporności bakterii i nadkażenia grzybiczego).
- Lek stosowany na otwarte rany przez dłuższy czas może spowodować ototoksyczność i nefrotoksyczność.

### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku **Unguentum Neomycini** u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

**Unguentum Neomycini** może wchodzić w interakcje z:

- tobramycyną,
- amikacyną,
- bacytracyną,
- cisplatyną,
- wankomycyną,
- amfoterycyną B,
- polimyksyną.

## Podmiot odpowiedzialny:

CHEMA-ELEKTROMET, Przemysłowa 9, Rzeszów

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.