

# Neosine Forte, 1000 mg, lek przeciwwirusowy, 10 tabletek



Cena: 14,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka Aflofarm

Substancja  
czynna Inosinum

Typ produktu

## Opis produktu

## Produkt leczniczy bez recepty

## Neosine Forte, 1000 mg - 10 tabletek

## (Inosinum pranobexum)

## Opis produktu:

Neosine forte jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

Lek Neosine forte zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

## Skład:

1 tabletkę zawiera:

- **substancję czynną** - inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum) 1000 mg (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3);
- **pozostałe składniki** - skrobia pszeniczna, mannitol, powidon 30, magnezu stearynian.

## Wskazania:

- **Wspomagająco u osób o obniżonej odporności**, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- **W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).**
- Lek Neosine forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.
- Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

## Działanie:

Lek Neosine Forte działa przeciwwirusowo i pobudza funkcje układu odpornościowego, przyczyniając się do zwiększenia odporności organizmu.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

### Zalecana dawka:

#### Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

- Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1000 mg, tj. 1 tabletkę 3 razy na dobę.

Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.

#### Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

- Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine forte w syropie.

### Sposób podawania

Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

### Czas trwania leczenia:

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

### Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neosine forte:

Brak danych dotyczących przedawkowania leku Neosine forte.

### Pominięcie przyjęcia leku Neosine forte

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie.

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

**Leku Neosine forte 1000 mg nie należy stosować:**

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
- u dzieci poniżej 1. roku życia.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):**

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi.
- nudności lub wymioty,
- ból brzucha,
- swędzenia wysypka skórna,
- ból głowy lub zawroty głowy,
- zmęczenie, złe samopoczucie,
- bóle stawów.

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):**

- biegunka,
- zaparcia,
- nerwowość,
- senność lub trudności w zasypianiu,
- wydalanie dużej ilości moczu.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:**

- leki do leczenia dny moczanowej (np. allopuryinol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej);

- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;
- leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);
- azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego, jeśli pacjent miał kamice nerkową, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.
- Lek zawiera skrobię pszeniczną, leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż celiakia).
- Lek **Neosine forte** mogą stosować pacjenci z celiakią.

### Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy przyjmować leku **Neosine forte** w okresie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem, który oceni, czy korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.