

Nexon, Syrop, na kaszel z porostu islandzkiego, max, chrypka, 200ml



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Nexon
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Syrop na kaszel z porostem islandzkim Max - 200ml

Kaszel, Chrypka, Podrażnienie Gardła

Opis:

- Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania celem ochrony i nawilżenia śluzówki jamy ustnej i gardła. Preparat pomaga łagodzić takie objawy jak: suchy kaszel, chrypka, uczucie suchości, pieczenie czy ból gardła.

Dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży i osób dorosłych

Skład:

- Wyciąg z plechy porostu islandzkiego (*Cetraria islandica* L. Ancharius), woda, sacharoza, glicerol, benzoosan sodu, guma ksantanowa, kwas cytrynowy, naturalny aromat truskawkowy.

Wskazania:

- Pomocniczo w czasie infekcji bakteryjnych i wirusowych (takich jak przeziębienie lub angina), a także po przebytych zachorowaniach celem łagodzenia podrażnień na śluzówce jamy ustnej i gardła.

Wyrób jest polecany:

- osobom uskarżającym się na suchy, drażniący kaszel,
- w przypadku podrażnienia i bólu gardła,
- przy bólach i pieczeniu w trakcie przełykania,
- przy uczuciu suchości w jamie ustnej i gardle będącej wynikiem niekorzystnych czynników zewnętrznych (np. przebywania w pomieszczeniach silnie ogrzewanych lub klimatyzowanych),
- osobom cierpiącym na chrypkę, która może pojawić się w wyniku nadwyrężania strun głosowych.

Działanie:

- Działanie preparatu jest oparte na znajdującym się w jego składzie wyciągu z porostu islandzkiego. Składnik ten zawiera substancje śluzowe, które tworzą powłokę chroniącą przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi. Pozwala to ułatwić przełykanie i ograniczyć odruch kaszlu

Stosowanie:

Dzieci w wieku 1-6 lat:

5 ml syropu 1-2 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat:

5 ml syropu 3-4 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Osoby dorosłe:

10 ml syropu 3-4 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

- Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelką z wyrobem.
- Wyrób może być stosowany niezależnie od pory dnia.
- Po każdym użyciu należy przepłukać kieliszek miarowy letnią wodą, pozostawić do wysuszenia (nie stosować środków i urządzeń do czyszczenia - zmywarka).

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do opakowania.

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia opakowania.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

- U dzieci może wywołać efekt przeczyszczający, jeśli jest stosowany w zbyt dużej ilości.

Stosowanie wyrobu z jedzeniem i pić

- Przez około pół godziny od zażycia wyrobu nie należy pić ani spożywać posiłków, celem zachowania właściwości powłoki ochronnej.

Ciąża i karmienie piersią

- Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- W przypadku małych dzieci produkt powinien być podawany przez osobę dorosłą.
- Wyrób jest przeznaczony do stosowania już w przypadku dzieci powyżej 1 roku życia. Stosowanie preparatu u dzieci poniżej 1 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej (15°C - 25°C). Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia opakowania.

Ważne:

- Wyrób medyczny posiada certyfikat CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.