

# Nicorette, Coolmint, 2mg, smak miętowy, tabletki do ssania, rzucanie palenia, 20tabletek

Cena: 26,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	McNeil
Substancja czynna	Nicotinum
Typ produktu	

## Opis produktu

### Lek wydawany bez recepty

Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania - 20 sztuk

(Nicotinum)

### Opis produktu:

Nicorette Coolmint tabletki do ssania łagodzi głód nikotynowy oraz objawy odstawienne po zaprzestaniu palenia.

### Skład:

**Substancja czynna:** Każda tabletki do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

**Substancje pomocnicze:**

**Rdzeń tabletki:**

Guma ksantan, Winterfresh RDE4-149 suszona rozpyłowo (guma arabska, aromaty mięty pieprzowej, mentolu i eukaliptusa), Sodu węglan bezwodny, Sukraloza, Acesulfam potasowy, Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza, Winterfresh RDE4-149 (aromaty mięty pieprzowej, mentolu i eukaliptusa), Tytanu dwutlenek (E 171), Sukraloza, Sepifilm Gloss (hypromeloza, celuloza mikrokryształiczna, krzemian glinowo-potasowy, tytanu dwutlenek (E 171)), Acesulfam potasowy, Polisorbat 80

## Wskazania:

- Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o wysokim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia w ciągu 30 minut od przebudzenia lub które wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę.

## Działanie:

- Tabletki do ssania zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń i pomagają w zmniejszeniu nasilenia głodu nikotynowego i objawów odstawiennych.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Stosować tabletki do ssania zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa.
- Należy przyjmować wystarczającą ilość tabletek do ssania na dobę, większości osób palących potrzeba zazwyczaj od 8 do 12 tabletek, nie należy przekraczać liczby 15 tabletek.
- Należy umieścić jedną tabletkę w jamie ustnej i poczekać, aż się rozpuści.
- Okresowo tabletkę należy przesuwać z jednej strony jamy ustnej na drugą i powtarzać tę czynność do chwili całkowitego rozpuszczenia tabletki (około 16-19 minut). Tabletki nie należy rozgryzać ani połykać w całości.
- Nie należy spożywać pokarmów ani pić w czasie, gdy tabletki do ssania znajdują się w jamie ustnej. Napoje, które obniżają pH w jamie ustnej, takie jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny w jamie ustnej. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie nikotyny, należy unikać spożywania tych napojów w ciągu 15 minut przed zastosowaniem tabletki do ssania.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Nikotynowa terapia zastępcza może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny w inny sposób, m.in. poprzez palenie papierosów. Można je przypisać działaniom farmakologicznym nikotyny, niektóre z nich są

zależne od dawki. W zalecanych dawkach nie stwierdzono, aby produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania wywierał jakiegokolwiek ciężkie działania niepożądane. Nadmierne stosowanie produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania przez osoby, które nie były uzależnione od wdychania dymu tytoniowego, może doprowadzić do wystąpienia nudności, skłonności do omdleń i bólów głowy.

- Niektóre obserwowane objawy, takie jak depresja, drażliwość, lęk, zwiększone łaknienie i bezsenność, mogą się wiązać z objawami odstawiennymi, będącymi wynikiem zaprzestania palenia. Osoby rzucające w jakikolwiek sposób palenie mogą oczekiwać wystąpienia u nich bólów lub zawrotów głowy, zaburzeń snu, nasilenia kaszlu lub przeziębienia.
- W obrębie każdej grupy o określonej częstotliwości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem: bardzo często (?1/10), często ( ?1/100 do