

Nifuroksazyd 200mg 20tabletek powlekanych



Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfarmex
Substancja czynna	Nifuroksazydum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Nifuroksazyd 200 mg - 20 tabletek powlekanych

(Nifuroksazydum)

Opis produktu:

Nifuroksazyd Polfarmex to lek stosowany w przypadku ostrej i przewlekłej biegunki pochodzenia bakteryjnego

Skład:

- Substancja czynna - nifuroksazyd (Nifuroksazydum)
- Substancje pomocnicze - skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian. Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żółty tlenek żelaza (E 172)

1 tabletki zawiera 200 mg nifuroksazydu

Wskazania:

- przebieg ostrej i przewlekłej biegunki pochodzenia bakteryjnego
- zakażenia pokarmowe

Działanie:

- Nifuroksazyd jest miejscowo działającym lekiem przeciwbakteryjnym
- nie wchłania się z jelita
- jest aktywny wobec: bakterii Gram - dodatnich z rodzaju Staphylococcus i niektórych gatunków bakterii Gram - ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae z rodzajów: Yersinia, Escherichia, Citrobacter., Enterobacter, Klebsiella, Salmonella.
- nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego wobec bakterii z gatunków: Proteus vulgaris, Proteus mirabilis oraz Pseudomonas aeruginosa.
- wydalany jest w postaci niezmienionej z kałem

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** 800 mg na dobę w 2-4 podzielonych dawkach
- **Dzieci w wieku powyżej 7 lat:** 600-800 mg na dobę w 2-4 podzielonych dawkach

Lek należy stosować doustnie, a tabletki połknąć w całości, popijając je odpowiednią ilością płynu (szklanka wody)

- Tabletek nie należy przegryzać, ani kruszyć.

Nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli po 3 dniach objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem

- Podczas leczenia biegunek nifuroksazydem, konieczne jest stałe uzupełniające nawadnianie doustne pacjenta. W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia, należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną, nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia (ze względu na postać produktu - tabletki)

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Nifuroksazyd Polfarmex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych:

- reakcje alergiczne np. reakcje skórne; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (objawiające się spuchnięciem twarzy, warg, języka, dusznością)
- wstrząs anafilaktyczny objawiający się splątaniem, bledością skóry, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem)

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- wysypka
- krosty na skórze

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- granulocytopenia (zmniejszenia liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów)
- świerzbiączka guzkowa w przebiegu alergii kontaktowej na nifuroksazyd
- bóle brzucha, nudności, nasilenie biegunki

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- podczas stosowania Nifuroksazydu nie powinno się stosować alkoholu
- jeśli biegunka będzie się utrzymywać lub ulegnie nasileniu po 2 lub 3 dniach leczenia, należy zgłosić się do lekarza
- w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej na lek, należy zaprzestać stosowania leku
- Nifuroksazyd zawiera laktozę.

Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia (ze względu na postać produktu - tabletki)

Ciąża, karmienie piersią:

- Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży ze względu na brak dostatecznych danych klinicznych pozwalających ocenić działanie teratogenne lub toksyczne nifuroksazydu na płód.
- Nifuroksazyd nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Niemniej jednak, ze względu na brak wystarczających danych klinicznych, należy w przypadku kobiet karmiących piersią zachować ostrożność oraz stosować nifuroksazyd jak najkrócej.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:

- Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku może wywołać reakcję disulfiramopodobną – groźną reakcję nietolerancji

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nifuroksazyd nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, .ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, **poinformuj nas o tym.**