

## Nifuroksazyd, biegunka, 200 mg x 12 tabletek



Cena: 7,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Nifuroksazydum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Nifuroksazyd Hasco 200 mg - 12 tabletek powlekanych (Nifuroksazydum)

### Opis produktu:

Nifuroksazyd 200 Hasco jest produktem leczniczym o działaniu przeciwbakteryjnym stosowanym w biegunkach

### Skład:

- **Substancja czynna** - nifuroksazyd (Nifuroksazydum)
- **Substancje pomocnicze** - skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian oraz otoczka Opadry II o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, żółcień chinolinowa, lak (E 104); talk, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa, lak (E 110); indygo karmin, lak (E 132)

1 tabletki powlekane zawiera 200 mg nifuroksazydu (Nifuroksazydum)

### Wskazania:

- ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego

## Działanie:

- **Nifuroksazyd** wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego
- **Nifuroksazyd** działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### Dorośli:

- 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych

### Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

- 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych
- **nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat**

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Lek stosuje się doustnie

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- **Nifuroksazyd** jest zwykle dobrze tolerowany
- mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórными odczynami alergicznymi

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów
- jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
- **Nifuroksazyd 200 Hasco zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne**

### Ciąża i karmienie piersią:

- w ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza

### Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- picie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję przejawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha
- lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

## Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Hasco-lek Żmigrodzka 242e Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.