

Nizoral, krem 20mg/g, 30 g McNeil



Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|----------------------|---------------|
| Producent / Marka | McNeil |
| Substancja czynna | Ketoconazolum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Nizoral 20 mg/g, krem - 30 g

(Ketoconazolum)

Opis produktu:

Lek Nizoral w postaci kremu zawiera substancję czynną ketokonazol o silnym działaniu przeciwgrzybiczym.

Skład:

- Substancją czynną leku jest ketokonazol.

1 g kremu zawiera 20 mg ketokonazolu.

- Pozostałe składniki:** glikol propylenowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, sorbitanu stearynian, polisorbát 60, izopropylu myrystynian, sodu siarczyn bezwodny (E 221), polisorbát 80, woda oczyszczona.

Wskazania:

- Miejscowe leczenie grzybicy skóry tułowia, pachwin, rąk i stóp wywołanych następującymi dermatofitami: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*, a także drożdżycy skóry i łupieżu pstrego (*Pityriasis versicolor*).

- Lek Nizoral, krem jest także zalecany w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry, związanego z obecnością drożdżaka *Malassezia ovale* (*Pityrosporum ovale*).

Działanie:

- Ketokonazol działa na dermatofity z rodzaju: *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum* i drożdżaki z rodzaju *Candida* i *Malassezia* (*Pityrosporum*).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek Nizoral, krem jest przeznaczony do stosowania na skórę u osób dorosłych.
- **Drożdżycza skóry, grzybica tułowi, pachwin, grzybica rąk i stóp, łupież pstry (*Pityriasis versicolor*):** zwykle pokrywa się lekiem Nizoral, krem chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz skórę bezpośrednio do nich przylegającą raz na dobę.
- **Łojotokowe zapalenie skóry:** w zależności od nasilenia objawów zakażenia zwykle stosuje się lek Nizoral, krem na chorobowo zmienione miejsca na skórze raz lub dwa razy na dobę.
- Leczenie należy kontynuować jeszcze przez kilka dni po całkowitym ustąpieniu objawów zakażenia.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nie ma poprawy po 4 tygodniach leczenia, gdyż konieczne jest zweryfikowanie diagnozy.
- W trakcie leczenia, w celu zapobieżenia powtórnemu zakażeniu, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Średni czas leczenia:

- łupież pstry od 2 do 3 tygodni,
- zakażenia drożdżakami od 2 do 3 tygodni,
- grzybica pachwin od 2 do 4 tygodni,
- grzybica tułowia od 3 do 4 tygodni,
- grzybica stóp od 4 do 6 tygodni,
- łojotokowe zapalenie skóry od 2 do 4 tygodni.

W łojotokowym zapaleniu skóry lekarz zwykle zaleca leczenie podtrzymujące, polegające na stosowaniu leku Nizoral, krem raz lub dwa razy w tygodniu

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na ketokonazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W czasie leczenia lekiem Nizoral, krem mogą wystąpić następujące objawy działań niepożądanych leku:

- **Często** (u więcej niż 1 na 100 i u mniej niż 1 na 10 pacjentów) rumień i świąd w miejscu podania oraz uczucie pieczenia skóry;
- **Niezbyt często** (u więcej niż 1 na 1000 i u mniej niż 1 na 100 pacjentów) w miejscu podania mogą wystąpić krwawienia, uczucie dyskomfortu i suchości, stan zapalny, podrażnienie, parestezje (przykre wrażenia, najczęściej mrowienia, drętwienia lub zmian temperatury skóry, tj. uczucie silnego gorąca lub zimna), reakcje w miejscu podania, nadwrażliwość, zmiany pęcherzykowe, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, łuszczenie i lepkość skóry.
- Po wprowadzeniu leku Nizoral, krem do obrotu **Bardzo rzadko** (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) występowała pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek Nizoral, krem zawiera substancje pomocnicze, m.in. glikol propylenowy i alkohol cetylowy.
- Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.
- Ze względu na zawartość alkoholu stearylowego i cetylowego lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Nie stosować u dzieci do 11 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem
- Przed zastosowaniem leku w chorobach skóry, w tym ropnych zmianach chorobowych zaleca się skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią lek Nizoral, krem można stosować tylko wtedy, gdy stosowanie leku zaleci lekarz, gdyż nie ma danych dotyczących

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podmiot odpowiedzialny:

MCNEIL Healthcare , Dublin 24 Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym

