

## No-Spa MAX, 80 mg, 20 tabletek



Cena: 24,49 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Substancja  
czynna Drotaverinum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## No-Spa Max, 80 mg - 20 tabletek powlekanych

(Drotaverini hydrochloridum)

### Opis produktu:

No-Spa Max jest to lek rozkurczowy, zmniejszający ból (bolesne skurcze) w obrębie narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej, czyli w obrębie przewodu pokarmowego (żołądka i jelit), dróg żółciowych i moczowych, a u kobiet również dróg rodnych.

### Skład:

- Substancją czynną jest - drotaweryna.
- Substancje pomocnicze - magnezu stearynian, talk, powidon, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna.

1 tabletkę zawiera 80 mg chlorowodoru drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum).

### Wskazania:

- w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.
- w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek

nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

#### Wspomagająco:

- **w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego:** chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki
- **w schorzeniach ginekologicznych:** bolesnym miesiączkowaniu.

## Działanie:

- Rozkurczowe,
- **zmniejsza ból (bolesne skurcze)** w obrębie narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej, czyli w obrębie przewodu pokarmowego (żołądka i jelit), dróg żółciowych i moczowych, a u kobiet również dróg rodnych.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli** - 1 tabletkę powlekana 2 lub 3 razy na dobę. Dawka dobową to 120 do 240 mg.
- **Dzieci w wieku powyżej 12 lat ( W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa Forte)** - 1 tabletkę powlekana 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową dla dzieci wynosi 160 mg.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek i serca,
- jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000):**

- reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd)
- ból i zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego), bezsenność
- kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi
- nudności, zaparcie.

**Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):**

- zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego.

**Interakcje:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Drotaweryna osłabia działanie lewodopy (lek stosowany w chorobie Parkinsona).

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Przed rozpoczęciem stosowania leku No-Spa należy omówić to z lekarzem.

**Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku No-Spa:**

- u pacjentów z niedociśnieniem
- u kobiet w ciąży.

Nie stosować leku w czasie porodu.

**Ciąża i karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
- Drotaweryna przenika przez łożysko.
- Nie stosować leku w czasie porodu.
- Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie karmienia piersią.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

- W dawkach leczniczych lek podawany doustnie nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności tj. prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

**Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:**

- Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.**