

Normosan, zioła do zaparzania, 100g



Cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Normosan mieszanka ziołowa - 100 g

Opis produktu:

Normosan to produkt leczniczy do stosowania jako środek przeczyszczający w zaparciach u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Skład:

Substancjami czynnymi są - kora kruszyny (*Rhamnus frangula*, cortex), liść senesu (*Cassia senna* L. lub *Cassia angustifolia*, folium), owoc kminku (*Carum carvi*, fructus), owoc bzu czarnego (*Sambucus nigra*, fructus), liść mięty pieprzowej (*Mentha x piperita*, folium).

100 g mieszanki zawiera:

- 20 g - kory kruszyny,
- 10 g - liści senesu,
- 35 g - owoców kminku,

- 18 g - owoców bzu czarnego,
- 17 g - liści mięty pieprzowej.

1,4 g mieszanki zawiera 19,6-29,4 mg antrapochnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Wskazania:

Normosan jest lekiem stosowanym w zaparciach.

Działanie:

- Normosan to lek wykazujący działanie przeczyszczające dzięki zawartym pochodnym związków antracenowych w liściu senesu i korze kruszyny.
- Związki te pobudzają perystaltykę jelita grubego co wpływa na przyspieszony pasaż jelitowy.
- Dodatkowo związki te wpływają również na hamowanie absorpcji wody i elektrolitów przez jelito grube oraz zwiększają przepuszczalność, co wpływa na wydzielanie wody i elektrolitów do światła jelita.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego w postaci odwaru.

1,4 g mieszanki ziołowej odpowiada 3/4 łyżki miarowej, czyli 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych.

- Działanie przeczyszczające występuje zwykle po 8-12 godzinach.
- Leczenie produktem nie powinno przekraczać 7-10 dni. Dłuższe stosowanie (powyżej 1-2 tygodni) wymaga konsultacji z lekarzem.
- Zazwyczaj wystarcza stosowanie od 2 do 3 razy w tygodniu.
- Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1,4 g ziół (3/4 łyżki miarkowej) zalać 1 szklanką zimnej wody, następnie zagotować pod przykryciem. Po ok. 15 minutach odcedzić. Gotowy odwar pić wieczorem, po jedzeniu (od 2/3 do całości przygotowanego odwaru).

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne, mentol, rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae; anyż, kminek, seler, kolendra, koper), rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, Compositae);
- niedrożności, zwężenia, atoni jelit, choroby zapalnej okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy),
- zapalenia wyrostka robaczkowego, bólu brzucha nieznanego pochodzenia, odwodnienia organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (głównie hipokaliemia);
- pacjentów z niedoborem lub brakiem kwasu solnego w żołądku, chorobą wątroby, kamieniami żółciowymi, zapaleniem dróg żółciowych lub innymi chorobami żółciowymi.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

skurczowe bóle brzucha w obrębie jamy brzusznej, wodnisty stolec - objawy świadczące o przedawkowaniu, należy w takim przypadku zmniejszyć dawkę, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, białkomocz, krwiomocz (przy długotrwałym stosowaniu), zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśniowe (skutkiem zaburzonej równowagi elektrolitowej i długotrwałym stosowaniem), zmiany pigmentacyjne w błonie śluzowej jelita grubego, żółte lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu (zależne od pH).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku, gdy pacjent przyjmuje leki moczopędne, leki przeciwaritmiczne, adrenokortykosteroidy, produkty z lukrecją.
- Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów z uporczywymi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego.
- Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających, przyczyna zaparć powinna być zbadana przez lekarza (szczególnie gdy istnieje potrzeba codziennego stosowania leku **Normosan**).
- Dłuższe stosowanie niż 7 dni może prowadzić do atonii okrężnicy z upośledzeniem jej funkcji i nasilenia zaparć.
- Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek są bardziej narażeni na zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Ciąża i karmienie piersią:

- Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Normosan może wchodzić w interakcje z: lekami przeciwaritmicznymi, lekami wpływającymi na rytm zatokowy, lekami wpływającymi na wydłużenie odcinka QT, glikozydami nasercowymi; lekami powodującymi hipokaliemię (leki moczopędne, adrenokortykosteroidy, korzeń lukrecji); innymi lekami przeczyszczającymi; lekami zapierającymi.

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA S.A." Pelplińska, Starogard Gdański

Masa netto: 100g

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.