

Nurofen Forte 24 tabl. ból, zapalenie, gorączka



Cena: 21,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Reckitt Benckiser Poland S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Nurofen Forte 400 mg tabletki powlekane 24 sztuki

(Ibuprofenum 400mg)

Opis produktu:

Lek **Nurofen Forte** o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Skład:

1 tabletkę leku Nurofen Forte zawiera:

Substancję czynną: Ibuprofen 400 mg

Pozostałe składniki: sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka cukrowa: karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 6000, tusz Opacode S-1-15094 (szlak, żelaza tlenek czerwony (E 172), glikol propylenowy, simeticon).

Wskazania:

Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:

- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, np. migrena, bóle okolicy krzyżowej, bóle zębów,

np. po ekstrakcji zębów, nerwobóle, bóle mięśni i stawów, bolesne miesiączkowanie.

- gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

Działanie:

Lek łagodzi takie dolegliwości, jak gorączka, ból i obrzęk poprzez działanie w miejscu ich powstawania.

Dawkowanie:

Lek **Nurofen Forte** należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować doustnie, krótkotrwanie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co 4 godziny. Tabletki należy popić płynem.

W przypadku niewydolności wątroby lub nerek, lekarz ustali indywidualne dawkowanie.

Osoby w podeszłym wieku: modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.

Przeciwwskazania:

Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie należy stosować leku **Nurofen Forte** u pacjentów:

- z nadwrażliwością (uczuleniem) na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy
- z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą perforacją lub krwawieniem, również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,
- przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),
- w III trymestrze ciąży.
- ze skazą krwotoczną.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek **Nurofen Forte** może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd.

Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki.

Bardzo rzadko: smółkate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, oliguria, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, matryca toksyczno-rozpływna naskórka, obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.

W pojedynczych przypadkach: depresja, reakcje psychotyczne i szумы uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W pojedynczych przypadkach, u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę, dezorientację.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny:

RECKITT BENCKISER POLAND S.A., ul. Okunia 1, Nowy Dwór Mazowiecki

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.