

Nurofen, gorączka, bóle różnego pochodzenia 200 mg x 12 tabletek



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Reckitt Benckiser
Substancja czynna	Ibuprofenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Nurofen, 200 mg - 12 tabletek powlekanych

(Ibuprofenum)

Opis produktu:

Nurofen wykazuje zdolność łagodzenia takich dolegliwości jak:

- ból, obrzęk, gorączka

Skład:

- **Substancja czynna:** ibuprofen (Ibuprofenum)
- **Substancje pomocnicze:** kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka cukrowa - karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), Macrogol 6000; tusz - Opacode S-1-8152 HV Black (czarny tlenek żelaza (E 172), szelak, lecytyna sojowa, środek przeciwpienny DC 1510) lub czarny tusz (szelak czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy)

Wskazania:

Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym:

- bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej
- bóle kostne i stawowe
- bolesne miesiączkowanie
- gorączka (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

Działanie:

- przeciwbólowe
- przeciwzapalne
- przeciwgorączkowe

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg):

- 1 tabletką 200 mg. W razie potrzeby, 1 tabletką co 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę (600 mg)

Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg):

- 1 tabletką 200 mg. W razie potrzeby, 1 tabletką co 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę (800 mg)

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- dawka początkowa - 2 tabletki, potem w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancją pomocniczą leku oraz na inne NLPZ
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
- z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, ównież tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca
- przyjmujących jednocześnie inne NLPZ, w tym inhibitory COX- 2

- w III trymestrze ciąży
- ze skazą skrwtoczną

Działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit:

- **niezbyt często:** niestrawność, ból brzucha, nudności.
- **rzadko:** biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka.
- **bardzo rzadko:** smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna.

Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku i perforacja

Zaburzenia układu nerwowego:

- **niezbyt często:** bóle głowy
- **rzadko:** zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia
- **w pojedynczych przypadkach opisywano:** depresję, reakcje psychotyczne i szумы uszne

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

- **rzadko:** obrzęki
- **bardzo rzadko:** zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

- **bardzo rzadko:** zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

- **bardzo rzadko:** zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza)

Zaburzenia skóry:

- **bardzo rzadko:** rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

-

leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser ul. Okunin1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.