

Olimp Immuven, preparat odżywczy o smaku kawowym, proszek 780g



Cena: 98,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Olimp

Substancja
czynna

-

Typ produktu

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Olimp Immuven, Preparat odżywczy, smak kawowy, 780 g

DIETA WYSOKOBIAŁKOWA, WYSOKOENERGETYCZNA, BEZRESZTKOWA

Olimp Immuven® to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego marki **Olimp Labs** przeznaczona do postępowania dietetycznego w celu wsparcia układu immunologicznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia w okresach okołoperacyjnych, przed zabiegami i po urazach, zwłaszcza u pacjentów chirurgicznych.

Informacja o wartości odżywczej 1 porcja (78 g = 2 miarki) rozpuszczona w 150 ml wody (200 ml płynu), 100 g

- Wartość energetyczna 1265 kJ/ 300 kcal - 1620 kJ/ 385 kcal
- Tłuszcz 8,0 g - 10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g - 0 g
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone 1,5 g -1,9 g

- w tym kwasy tłuszczowe omega-3 Nie mniej niż 435 mg - Nie mniej niż 558 mg
- w tym kwas eikozapentaenowy (EPA) Nie mniej niż 255 mg - Nie mniej niż 327 mg
- w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) Nie mniej niż 180 mg - Nie mniej niż 230 mg
- Węglowodany 39 g - 50 g
- w tym cukry 4,3 g - 5,5 g
- Błonnik 0 g - 0 g
- Białko 18 g - 23 g
- Sól 0,15 g - 0,19 g
- Witamina A (µg-RE) 160 µg - 205 µg
- Witamina D 10 µg - 12,8 µg
- Witamina K 15 µg - 19,2 µg
- Witamina C 160 mg - 205 mg
- Tiamina 0,5 mg - 0,64 mg
- Ryboflawina 0,28 mg - 0,36 mg
- Witamina B6 0,28 mg - 0,36 mg
- Niacyna (mg NE) 3,2 mg - 4,1 mg
- Kwas foliowy 40 µg - 51,3 µg
- Witamina B12 0,5 µg - 0,64 µg
- Kwas pantotenowy 1,2 mg - 1,5 mg
- Biotyna 10 µg - 12,8 µg
- Witamina E (mg α-TE) 4 mg - 5,1 mg
- Sód 170 mg - 218 mg
- Chlorki 160 mg - 205 mg
- Potas 400 mg - 513 mg
- Wapń 160 mg - 205 mg
- Fosfor 140 mg - 180 mg
- Magnez 75 mg - 96,2 mg
- Żelazo 2,8 mg - 3,6 mg
- Cynk 5 mg - 6,4 mg
- Miedź 203 µg - 38,5 µg

- Jod 30 µg - 38,5 µg
- Selen 30 µg - 38,5 µg
- Mangan 0,4 mg - 0,5 mg
- Chrom 8 µg - 10,3 µg
- Molibden 10,5 µg - 13,5 µg
- Fluorki 0 mg - 0 mg
- Beta-1,3/1,6-glukan 100 mg- 128 mg
- L-arginina 4500 mg - 5769 mg
- Osmolarność 495*mOsm/l

*W przypadku rozpuszczenia porcji (78 g) produktu w 200 ml wody osmolarność roztworu wynosi 325 mOsm/l.

Składniki:

maltodekstryny kukurydziane, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), olej roślinny (rzepakowy), L-arginina, olej rybi (źródło kwasów omega-3), aromaty, sole potasowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu cytrynowego, węglan wapnia, kwas L-askorbinowy - witamina C, chlorek sodu, beta-glukany z drożdży (*Saccharomyces cerevisiae*), substancje słodzące — acesulfam K, sukraloza; diglicynian cynku, difosforan żelaza(III) (pirofosforan żelaza(III)), octan DL-alfa-tokoferylu - witamina E, selenian(IV) sodu, cholekalcyferol - witamina D, glukonian manganu, nikotynamid - niacyna, octan retinylu - witamina A, glukonian miedzi(II), D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek tiaminy, monoazotan tiaminy - tiamina, cyjanokobalamina - witamina B12, chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6, filochinon (fitomenadion) - witamina K, ryboflawina, barwnik - E 150c; kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) - folian, chlorek chromu(III) i jego heksahydrat, jodek potasu, molibdenian(VI) sodu, D-biotyna - biotyna.

Instrukcja stosowania:

Poleca się przyjmować jedną porcję (78 g) produktu 1-3 razy na dobę przez 5 dni przed operacją i po operacji jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli jest stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Instrukcja przygotowania:

W celu sporządzenia 200 ml produktu gotowego do spożycia, należy do naczynia zawierającego 150 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej wsypywać 1 porcję (78 g, tj. zawartość 2 miarek), ciągle mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Ważne:

- nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży,
- kobiet karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- w przypadku występowania innych chorób (np. nadciśnienia) lub przyjmowania leków należy poinformować lekarza.
- w trakcie stosowania nie spożywać alkoholu
- preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego
- nie spożywać innych preparatów zawierających cynk (dotyczy spożywania trzech porcji (po 78 g) dziennie lub więcej)

- poinformować lekarza w przypadku predyspozycji do tworzenia kamieni nerkowych lub kamicy nerkowej.

Uwagi:

- przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
- chronić przed wilgocią.
- przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto: 780g (10 porcji)

Producent:

Olimp Laboratories Sp. z o.o. Pustynia 84F 39-200 Dębica.