

## Orofar MAX, ból gardła, 20pastylek



Cena: 29,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Stada
Substancja czynna	Cetylpyridinium, Lidocainum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Orofar max - 20 pastylek twardych

### (Cetylpyridinii chloridum, lidocaini hydrochloridum)

SMAK MIĘTOWY

### Opis produktu:

Orofar MAX to produkt leczniczy do stosowania w bólu i w podrażnieniu gardła w zapaleniu gardła. Lek miejscowo znieczula (łagodzi ból), odkaża błony śluzowe jamy ustnej

### Skład:

- **Substancja czynna:** cetylpirydyniowy chlorek (Cetylpyridinii chloridum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum)
- **Substancje pomocnicze:** olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol

### Wskazania:

- stany zapalne i ból w jamie ustnej
- ból gardła

## Działanie:

- przeciwbólowe
- przeciwwirusowe
- przeciwbakteryjne
- przeciwgrzybicze

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

- nie należy stosować leku Orofar MAX u dzieci poniżej 6. roku życia

### Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

- 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, maksymalna dobową dawką wynosi 3 pastylki

### Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- maksymalna dobową dawką to 6 pastylek
- ostre stany zapalne gardła i jamy ustnej: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu
- łagodniejsze stany zapalne gardła i jamy ustnej: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu

Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać. Nie należy stosować leku Orofar MAX w trakcie jedzenia ani tuż przed jedzeniem. Orofar MAX jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. W przypadku gdy objawy utrzymują się przez dłużej niż 5 dni lub jeśli towarzyszy im wysoka gorączka, wymioty lub zawroty głowy należy skonsultować się z lekarzem

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia

## Działania niepożądane:

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- podrażnienie jamy ustnej
- podrażnienie gardła
- nudności

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):**

- wysypka skórna

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

**Ciąża i karmienie piersią:**

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

- 

leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

## Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

