

# Ortanol MAX , 20mg, omeprazolum, zgaga, nadkwaśność ,14kapsułek, InPharm



Cena: 10,31 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Omeprazolum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Ortanol Max 20 mg, kapsułki dojelitowe - 14 sztuk

(Omeprazolum)

## Import

Inpharm Sp. z o.o.,

## Opis produktu:

Ortanol Max to produkt leczniczy z grupy „inhibitorów pompy protonowej” zmniejszający ilość produkowanego kwasu solnego w żołądku. Lek stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przłykowego (tj. zgaga, refluks, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej, kwaśne odbijanie). Lek Ortanol Max ma postać kapsułek dojelitowych i jest dostępny bez recepty.

## Skład:

**Substancje czynne:** 20 mg omeprazolu

**Substancje pomocnicze** - Granulki: sacharoza, ziarenka, hypromeloza, powidon K25 sodu laurylosiarczan, magnezu tlenek ciężki, talk, kwasu metakrylowego i etyloakrylanu kopolimer 1:1, dyspersja 30%, trietylu cytrynian, magnezu stearynian. Kapsułka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

Każda kapsułka dojelitowa, twarda, zawiera 20 mg omeprazolu.

## Wskazania:

Lek Ortanol Max stosowany jest w w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego\*.

\*Refluks polega na cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów, jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego posmaku w ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści).

## Działanie:

- Ortanol Max to produkt leczniczy zawierający omeprazol, który należy do inhibitorów pompy protonowej.
- Omeprazol zmniejsza ilość wydzielanego kwasu solnego w żołądku poprzez wpływ na komórki okładzinowe żołądka, które są odpowiedzialne za produkcję kwasu solnego.
- Hamowanie komórek okładzinowych jest odwracalne.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ortanol Max to lek do stosowania doustnego.

- **Dorośli:** zwykle stosuje się 1 kapsułek (20 mg) raz na dobę przez 14 dni.
- Lek Ortanol Max zaleca się stosować rano. Można go przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).
- Kapsułki twarde dojelitowe należy połknąć w całości, popijając połową szklanki wody - nie żuć, nie zgniatać.
- Jeśli pacjent ma duży problem z połykaniem leku - kapsułek można otworzyć, nie należy żuć peletek.
- Dla złagodzenia objawów, ten lek z grupy inhibitorów pompy protonowej powinien być przyjmowany przez 2-3 kolejne dni.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Nie należy stosować leku Ortanol Max:

- jeśli pacjent: ma nadwrażliwość na substancję czynną - omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- ma uczulenie na pozostałe leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol); przyjmuje nelfinawir.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia jakiegokolwiek spośród poniższych działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Ortanol MAX oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem: nagłe świsły, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie

przełykania; zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczeniem, krwawienie w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych; zażółcenie skóry, ciemna barwa moczu i uczucie zmęczenia.

**Często występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 na 100 osób): bóle głowy; nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka; zaparcie, wzdęcie; łagodne polipy żołądka.

**Niezbędnie często występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 na 1000 osób): zaburzenia snu; zawroty głowy, senność; uczucie mrowienia; wysypka skórna; złe samopoczucie.

**Rzadko występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi (co może powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub łatwiejszy rozwój zakażeń); pobudzenie, splątanie, depresja; zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia; suchość w jamie ustnej; zaburzenia czynności wątroby; ciężkie zaburzenia czynności nerek; wypadanie włosów; zwiększona potliwość; wysypka skórna w wyniku narażenia napromienienie słoneczne; ból stawów lub mięśni.

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmiany w morfologii krwi; agresja; omamy; osłabienie mięśni; powiększenie piersi u mężczyzn.

**Częstotliwość nieznana:** zmniejszenie stężenia magnezu, któremu może towarzyszyć zmniejszenie stężenia potasu i/lub wapnia; mikroskopowe zapalenie jelita grubego; wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Stosowanie leku grupy inhibitory pompy protonowej z omeprazolem dłuższe niż 14 dni wymaga konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia poniższych objawów, należy skonsultować się z lekarzem:

- nieuzasadniona utrata masy ciała;
- wymioty (krwawe); smoliste stolce; uporczywa biegunka; żółtaczka.

Stosowanie leku Ortanol Max na nadkwaśność należy koniecznie omówić z lekarzem jeśli w przeszłości wystąpiła wysypka skórna po zastosowaniu leku podobnego do Ortanol Max (np. z grupy inhibitory pompy protonowej, zawierającego omeprazol)

Leku Ortanol Max nie należy stosować zapobiegawczo.

Ortanol MAX zawiera sacharozę i sól.

### Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Ten lek z grupy inhibitorów pompy protonowej przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek Ortanol MAX nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia, wtedy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

### Wpływ na badania laboratoryjne:

- Przed przyjęciem leku Ortanol Max należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi (oznaczenie stężenia chromograniny A).

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Lek Ortanol Max może wchodzić w interakcje z następującymi lekami: ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych); digoksynę (stosowaną w leczeniu zaburzeń czynności serca); diazepam (stosowany w leczeniu lęku); fenytoinę (stosowaną w leczeniu padaczki); warfarynę (lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi); ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy); atazanawir lub sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV); takrolimus (stosowany m. in. po przeszczepieniu narządów); ziele dziurawca (*Hypericum perforatum*) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji); cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego); klarytromycyna (antybiotyk); erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych nowotworów); metotreksat (stosowany np. w leczeniu chorób nowotworowych lub chorób reumatoidalnych).

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Producent:

Lek. S.A. Domaniewska 50c, Warszawa

## Importer Równoległy:

InPharm Sp. zo.o., Strumykowa 28/11 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.