

# Otinum krople do uszu roztwór 10g import

Cena: 30,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent /  
Marka PHARMAPOINT S.A.

Substancja  
czynna Cholini salicylas

Typ produktu

## Opis produktu

### Lek wydawany bez recepty

Otinum 200mg/g, krople do uszu, roztwór, 1 butelka 10g

Import równoległy Medezin

(Cholini salicylas)

Produkt pochodzi z importu równoległego.

Lek przeznaczony do stosowania doraźnego w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego.

### Skład:

**Substancja czynna:** choliny salicylan.

1g kropli zawiera 0,2g choliny salicylanu.

**Substancje pomocnicze** - glicerol, etanol 96%, chlorobutanol, woda oczyszczona.

## Wskazania:

- doraźne leczenie stanów zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego, objawiający się bólem, świądem, zaczerwienieniem.

## Działanie:

- Cholina salicylan stosowany miejscowo ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.
- Zmniejsza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego.
- Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, co ułatwia jej usuwanie,
- Po podaniu miejscowym do ucha, lek nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Dorośli :

W celu krótkotrwałego leczenia miejscowego objawów ostrego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego:

- zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin.
- bez zalecenia lekarza nie stosować leku Otinum dłużej niż 3 dni.

W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha:

- zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez 4 dni.

Lek Otinum stosuje się wyłącznie miejscowo, do ucha.

**Lek Otinum przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.**

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub substancje czynną.

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną (cholina salicylan), inne salicylany ( np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeżeli u pacjenta występuje krwawienie lub wyciek z ucha
- jeżeli pacjent odczuwa silny ból ucha wraz z pogorszeniem słuchu
- jeżeli u pacjenta wcześniej rozpoznano uszkodzenie błony bębenkowej (pęknięcie lub przerwanie ciągłości)
- u osób poniżej 18 lat.

O perforacji błony bębenkowej mogą świadczyć: ostry ból w uchu, szумы w uszach, niedosłuch, zawroty głowy oraz wyciek z ucha.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry)
- u osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania leku może dojść do uszkodzenia słuchu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Każdy ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.
- Lek stosowany do leczenia stanu zapalnego przewodu słuchowego zewnętrznego bez konsultacji z lekarzem można stosować doraźnie, nie dłużej niż 3 dni.
- W przypadku braku poprawy lub nasilenia się dolegliwości pomimo stosowania leku Otinum w zalecanych dawkach przez 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeżeli pojawią się dodatkowe objawy świadczące o rozwijającym się procesie chorobowym ( np. gorączka, złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, wyciek z ucha) należy skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku nawrotu choroby, o zastosowaniu leku Otinum powinien zdecydować lekarz.
- Lek Otinum może maskować objawy innych chorób uszu i utrudnić lub opóźnić ich prawidłowe rozpoznanie.
- Lek zawiera konserwant - chlorobutanol.

### Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn :

- Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Lek jest stosowany miejscowo, nie wykazują działania ogólnego. Jednoczesne stosowanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. aspiryna, ibuprofen) może nasilać działanie miejscowe.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

SIA Meda Pharma

## Import równoległy:

Medezin Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.