

Otrivin 0,05% d/dzieci aerozol do nosa



Cena: 31,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	GlaxoSmithKline
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Otrivin dla dzieci aerozol do nosa - 10 ml

(Xylometazolini hydrochloridum 0,5mg/ml)

Opis produktu:

Otrivin krople dla dzieci to lek w postaci aerozolu do nosa, odpowiedni do stosowania u dzieci **od 2. do 11. roku życia**. Substancją czynną leku jest chlorowodorek **ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum)**, który ma zdolność obkurczania naczyń krwionośnych, dzięki czemu lek Otrivin zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, a także ułatwia usuwanie nadmiaru wydzieliny i oddychanie u pacjentów z uczuciem zatkanego nosa.

Skład:

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum) 0,5 mg
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona

Wskazania:

Lek Otrivin krople dla dzieci stosuje się u dzieci od 2. do 11. roku życia:

- w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa
- kataru siennego
- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
- zapalenia zatok
- w celu ułatwienia odpływu wydzieliny ze zmienionych zapalnie zatok przynosowych
- wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego (w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej)
- w celu ułatwienia wziernikowania nosa (badania jamy nosowej)

Działanie:

- szybka i długotrwała ulga przy zatkanym nosie

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

W celu uniknięcia rozpowszechniania się zakażenia, jedno opakowanie leku Otrivin dla dzieci można stosować tylko u jednego pacjenta.

- **Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:** 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, 1-2 razy na dobę (co 8-10 godzin), pod nadzorem dorosłych
- **Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:** 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, 2-3 razy na dobę, pod nadzorem dorosłych
- Nie stosować częściej niż 3 razy na dobę

Ostatnią dobową dawkę leku zaleca się przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać. Nie stosować leku dłużej niż przez 10 dni.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- Uczulenie na ksylometazolinę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku).
- Bardzo sucha błona śluzowa nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).
- Nie podawać po operacji wykonywanej przez nos, np. usunięcie przysadki lub operacji przebiegającej z odsłonięciem opony twardej.
- Nie podawać leku dzieciom poniżej 2. roku życia

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często (występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

- reakcja alergiczna: wysypka skórna, swędzenie, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami
- przemijające zaburzenia widzenia
- niemiarowa lub przyspieszona czynność serca

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ze względu na interakcje z tego rodzaju lekami, nie należy stosować leku Otrivin dla dzieci równocześnie z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi:

- inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), również w ciągu 14. dni od zaprzestania brania tych leków
- trój- i czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku Otrivin dla dzieci należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli:

- u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
- pacjent cierpi na choroby serca
- pacjent ma nadczynność tarczycy
- pacjent choruje na cukrzycę
- u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego
- pacjent cierpi na łagodny nowotwór nadnercza, który wytwarza duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz chromochłonny)
- pacjent przyjmuje (lub w ostatnich 14. dniach przyjmował) niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy – IMAO)
- u pacjenta występuje nadwrażliwość na substancje o działaniu podobnym do ksylometazoliny

U niektórych wrażliwych pacjentów lek Otrivin dla dzieci może powodować:

- bezsenność

- zawroty głowy
- nieregularne bicie serca
- podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
- drżenie

Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błon śluzowych

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie wolno stosować leku Otrivin dla dzieci u pacjentów poniżej 2. roku życia
- lek Otrivin dla dzieci należy stosować u pacjentów od 2. do 11. roku życia wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.