

Otrivin, Allergy, aerozol przeciwalergiczny 15ml



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	GlaxoSmithKline
Substancja czynna	Phenylephrinum, Dimetindenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Otrivin Allergy aerozol do nosa - 15 ml

(Phenylephrinum + Dimetindeni maleas)

Opis produktu:

Otrivin Allergy to produkt leczniczy, który poprzez zawarte w nim substancje czynne hamuje reakcję alergiczną, ułatwia oczyszczanie przewodów nosowych oraz zmniejsza katar a przy tym nie zaburza czynności rzęsek nabłonka jamy nosowej.

Lek szybko i na długo zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie

Skład:

1 ml roztworu zawiera:

- substancje czynne: fenylefrynę 2,5 mg dimetyndenu maleinian 0,25 mg
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy deterpenowany, wodę oczyszczoną.

Wskazania:

Lek Otrivin Allergy (2,5 mg + 0,25 mg)/ ml aerozol do nosa stosuje się u dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych:

- w leczeniu objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego i niesezonowego zapalenia błony śluzowej nosa
- wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok i w zapaleniu ucha środkowego
- w pielęgnacji przed- i pooperacyjnej w chirurgii nosa

Działanie:

- powoduje zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa
- hamuje działanie histaminy, która odpowiada za reakcje alergiczne
- lek udrażnia nos i ułatwia oddychanie

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- **Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych):** 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.
- **Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat:** 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę; ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- uczulenie na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem strupów)
- przyjmowanie obecnie inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmowanie tych leków w ciągu ostatnich 14 dni
- jaskra z wąskim kątem przesączania
- wiek poniżej 6 lat
- ciąża i laktacja

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- dyskomfort w nosie
- suchość nosa
- krwawienie z nosa
- pieczenie w miejscu podania

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Przed zastosowaniem leku aerozol do nosa Otrivin Allergy należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował ostatnio następujące leki:

- inhibitory monoaminoooksydazy
- leki przeciwdepresyjne (takie jak imipramina, amitryptylina)
- leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym (takie jak propranolol, atenolol, metoprolol)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów cierpiących na: choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzycę, rozrost gruczołu krokowego, padaczkę
- w przypadku osób z nadwrażliwością na adrenomimetyki (np. epinefryna, efedryna), która objawia się bezsennością, zawrotami głowy, drżeniem, zaburzeniami rytmu serca lub zwiększonym ciśnieniem krwi, przed użyciem leku należy skonsultować się z lekarzem
- Otrivin Allergy zawiera chlorek benzalkoniowy, prowadzący do podrażnienia błon śluzowych
- Otrivin Allergy zawiera sorbitol, więc nie należy stosować go u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadto, jeśli pacjent posiada zdiagnozowaną nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku powinien skonsultować się z lekarzem. **Jedna dawka leku zawiera 5 µg sorbitolu, który jest źródłem 1,25 µg fruktozy**

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

-

nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Otrivin Allergy nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat

- u dzieci w wieku od 6 do 12 lat należy stosować pod nadzorem osoby dorosłej

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- aerozol do nosa Otrivin Allegry nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.