

Otrivin Menthol aerozol do nosa 1 mg/ml 10 ml



Cena: 28,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Otrivin Menthol, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór, 10 ml

(Xylometazolini hydrochloridum 1 mg/ml)

Importer Równoległy: InPharm

Opis produktu:

Otrivin Menthol to lek bez konserwantów w postaci aerozolu do nosa, którego substancją czynną jest **ksylometazoliny chlorowodorek**.

Dodatkowo Otrivin Menthol zawiera substancje (m.in. eukaliptol), które powodują uczucie chłodu na błonach śluzowych.

Skład:

- **Substancja czynna leku:** ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum).
- **Substancje pomocnicze:** sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makroglicerolu hydroksystearnian, woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodoru.

Wskazania:

Otrivin Menthol stosuje się:

- w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok;
- wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego, ponieważ lek zmniejsza przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej,
- jako środek ułatwiający wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Działanie:

- Otrivin Menthol jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.
- Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie.
- Dodatkowo lek zmniejsza przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej.
- Lek zawiera substancje pomocnicze, takie jak **mentol** i **eukaliptol**, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu.
- Działanie leku Otrivin Menthol rozpoczyna się w ciągu 2 minut i trwa do dwunastu godzin.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
- Ostatnią dawkę leku należy przyjąć bezpośrednio przed snem.
- **Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.**
- Leku Otrivin Menthol nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.
- Jeśli objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

Produktu Otrivin Menthol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek podaje się do nosa.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku:

- nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat

- w czasie ciąży
- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania
- jeśli błona śluzowa nosa jest sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa)

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych, mogący być objawem reakcji alergicznej:

- trudności w oddychaniu lub przełykaniu,
- opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła,
- silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób stosujących lek):

- suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100) osób stosujących lek):

- krwawienie z nosa

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

- reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), zaburzenia widzenia, niemiaraowa lub przyspieszona czynność serca.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- **Otrivin Menthol** nie należy stosować w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji: inhibitory monoaminooksydazy (MAO) oraz trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku Otrivin należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli:

- u pacjenta występują: podwyższone ciśnienie krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, rozrost gruczołu krokowego, łagodny nowotwór nadnerczy,
- jeśli pacjent przyjmuje lub w ostatnich 14 dni były podawane inhibitory MAO (leki stosowane w depresji).
- u osób wrażliwych lek może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie

tętnicze.

- stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich nawrót.
- nie stosować Otrivin Menthol do oczu lub w jamie ustnej.
- w przypadku cukrzycy oraz rozrostu gruczolu krokowego.

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- **nie należy stosować leku w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek Otrivin Menthol można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.**

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- produktu Otrivin Menthol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- **Otrivin Menthol** stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne:

- Otrivin Menthol nie zawiera substancji konserwujących.
- Zawiera 2,75 mg/ml makrogolglycerolu hydroksystearynianu. Może powodować reakcje skórne.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Importer Równoległy:

InPharm Sp. Z o. o., Strumykowa, Warszawa

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.