

Otrivin, Menthol, aerozol do nosa, udrożnia nos 10 ml



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	GlaxoSmithKline
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Otrivin Menthol aerozol do nosa - 10 ml

(Xylometazolini hydrochloridum 1 mg/ml)

Opis produktu:

Otrivin Menthol to lek bez konserwantów w postaci aerozolu do nosa, którego substancją czynną jest **ksylometazoliny chlorowodorek**.

Lek stosuje się w celu odblokowania nosa i łatwiejszego oddychania podczas kataru, przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa.

Skład:

Substancją czynną leku jest **ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum)**

1 ml roztworu zawiera 1 mg **ksylometazoliny chlorowodoru**

Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makroglicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona.

Otrivin Menthol nie zawiera substancji konserwujących

Wskazania:

Otrivin Menthol stosuje się:

- w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok
- wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego, ponieważ lek zmniejsza przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej,
- jako środek ułatwiający wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej)

Działanie:

- **Otrivin Menthol** wykazuje działanie miejscowe: zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie
- Lek zawiera także substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek podaje się do nosa

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę
- Ostatnią dawkę leku należy przyjąć bezpośrednio przed snem

Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Leku Otrivin Menthol nie należy stosować dłużej niż przez **10 kolejnych dni**. Jeśli objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Leku Otrivin Menthol nie powinno się stosować w przypadku:

- uczulenia na ksylometazolinę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- przebiecia operacji wykonywanej przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta)
- jaskry z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku)
- bardzo suchej błony śluzowej nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa)

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych, mogący być objawem reakcji alergicznej:

- trudności w oddychaniu lub przełykaniu
- opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła
- silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób stosujących lek):

- suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

- reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Leku Otrivin Menthol nie należy stosować w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji, takich jak:

- inhibitory monoaminoooksydazy (IMAO). Nie należy stosować leku Otrivin Menthol w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów IMAO lub stosowania takich leków w ciągu ostatnich 14 dni
- trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne
- W przypadku stosowania któregośkolwiek z powyższych leków przed zastosowaniem leku Otrivin Menthol należy skonsultować się z lekarzem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują:

- podwyższone ciśnienie krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, rozrost gruczołu krokowego, łagodny nowotwór nadnerczy
- należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent przyjmuje lub w ostatnich 14 dni były podawane inhibitory MAO (leki stosowane w depresji)
- u osób wrażliwych lek może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze
- Otrivin Menthol zawiera makroglicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany)

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich

nawrót.

Nie stosować Otrivin Menthol do oczu lub w jamie ustnej

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

- nie należy stosować leku w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek Otrivin Menthol można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- produktu Otrivin Menthol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Otrivin Menthol stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.