

## Oxalin Junior, żel do nosa, 0,5 mg/g, oxymetazolin, 10 g



Cena: 19,25 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Oxalin Junior, 0,5 mg/g, żel do nosa dla dzieci powyżej 6 roku życia - 10 g

(Oxymetazolini hydrochloridum)

### Opis produktu:

Oxalin 0,05% w postaci żelu do nosa przeznaczony do stosowania jest dla dzieci w wieku powyżej 6 roku życia.

W ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych.

### Skład:

- **Substancja czynna** - oksymetazolinowy chlorowodorek.
- **Substancje pomocnicze** - sodu chlorek, disodu fosforan dwunasto wodny, sodu diwodoru fosforan jednowodny, disodu edetynian, hydroksyetylocelulozę, glicerol, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 0,5 mg oksymetazolinowego chlorowodoru.

## Wskazania:

Dzieci w wieku powyżej 6. roku życia.

Obrzęk błon śluzowych występujący w:

- ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa
- alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa
- zapaleniu trąbki słuchowej
- zapaleniu trąbki słuchowej
- zapaleniu zatok przynosowych
- zapaleniu ucha środkowego

## Działanie:

- Zwężenie naczyń krwionośnych,
- zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa i zahamowanie nadmiernego wydzielania.
- poprawia drożność przewodów nosowych,
- ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych.
- ułatwia oddychanie
- nawilża błonę śluzową nosa,
- nie spływa do gardła.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci od 6 do 12 rok życia:

1 dawka do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):**

- pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

**Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):**

- kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca; zwiększenie ciśnienia tętniczego.

**Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):**

- niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy; zmęczenie; silne uczucie „zatkania nosa” w wyniku nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania leku, jako objaw przekrwienia reaktywnego).

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- 

Przedawkowanie lub przypadkowe wypicie leku, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) jednocześnie lub bezpośrednio przed zastosowaniem oksymetazoliny może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera w składzie chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.
- Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

**Ciąża, karmienie piersią:**

- 

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

- 

Podczas długotrwałego stosowania leku lub w większych dawkach niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia działań ogólnoustrojowych dotyczących układu krążenia. W takich przypadkach sprawność psychofizyczna, zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mogą być zaburzone.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.