

Panadol Baby syrop 100ml



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka GlaxoSmithKline

Substancja
czynna Paracetamol

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Panadol, 120mg/ 5ml - 100 ml syrop

(Paracetamol)

SMAK TRUSKAWKOWY

Opis produktu:

Panadol dla dzieci to lek w postaci zawiesiny doustnej o smaku truskawkowym. Obniża gorączkę i łagodzi ból

Skład:

- Substancja czynna - paracetamol (Paracetamolum)
- Substancje pomocnicze - kwas jabłkowy, azorubina, guma ksantan, maltitol ciekły, aromat truskawkowy, sorbitol 70 % (krystalizujący), metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219), etylu parahydroksybenzoesan sodowy (E215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217), sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 120 mg paracetamolu

Wskazania:

- ból i gorączka towarzyszące przeziębieniu i grypie lub po szczepieniach ochronnych
- ból różnego pochodzenia jak np. bolesne żąbkowanie, ból zębów, głowy, gardła, ucha

Działanie:

- Panadol dla dzieci zawiera paracetamol, który wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Już od 3 miesiąca życia można stosować Panadol dla dzieci truskawkowy. Dawkowanie ustala się wg masy ciała.

Dziecko 3 miesiące (6 kg):

- 3,5 ml

Dziecko 6 miesięcy (8 kg):

- 5 ml

Dziecko 9 miesięcy (9 kg):

- 5,5 ml

Dziecko 1 rok (10 kg):

- 6 ml

Dziecko 2 lata (12,5 kg):

- 8 ml

Dziecko 3 lata (15 kg):

- 9 ml

Dziecko 4 lata (17 kg):

- 10,5 ml

Dziecko 5 lat (19 kg):

- 12 ml

Dziecko 6 lat (21 kg):

- 13 ml

Dziecko 9 lat (30 kg):

- 19 ml

Dziecko 12 lat (42 kg):

- 26 ml

Podanie wyłącznie doustne.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Kiedy nie stosować leku Panadol dla dzieci:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli są stosowane inne leki zawierające paracetamol
- jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nerek

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- wysypka skórna, swędzenie skóry, utrudnione oddychanie
- opuchlizna warg, języka
- sińce i krwawienia o nieznannej przyczynie
- zaburzenia czynności wątroby
- ostra, uogólniona wysypka krostkowa
- gorączka
- problemy z oddychaniem (szczególnie jeśli w przeszłości występowały podobne objawy po podaniu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

- z niewydolnością wątroby i nerek
- z niedoborem enzymów: dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej
- z niedowagą lub niedożywionymi, cierpiącymi z powodu anoreksji,
- regularnie spożywających alkohol
- przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku ciężkiej infekcji (posocznicy), która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej
- należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią objawy kwasicy metabolicznej
- jeśli pacjent cierpi na przewlekłe bóle głowy, należy skonsultować się z lekarzem
- należy skontaktować się z lekarzem jeśli objawy chorobowe nie ustępują
- nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana
- w czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby
- jeżeli gorączka nie ustąpi w ciągu 24 godzin, należy skonsultować się z lekarzem. Ponieważ gorączka może być objawem ciężkiej infekcji, która wymaga szybkiej diagnozy. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni
- stosowanie paracetamolu może być przyczyną zafałszowanych wyników krwi niektórych badań laboratoryjnych (np. glukozy we krwi)

Panadol dla dzieci zawiera azorubinę, sorbitol, maltitol i estry parahydroksybenzoesanów.

Dzieci i młodzież:

- nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 3 miesięcy
- przed podaniem leku dziecku poniżej 2 roku życia wskazany jest kontakt z lekarzem

Ciąża, karmienie piersią:

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Wpływ na badania laboratoryjne:

- paracetamol może wpływać na niektóre badania laboratoryjne, np. oznaczanie glukozy we krwi

Interakcje:

Panadol dla dzieci może wchodzić w interakcje z:

- metoklopramidem
- lekami przeciwzakrzepowymi

- lekami nasennymi, lekami przeciwpadaczkowymi
- inhibitorami MAO

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.