

# Pangrol, 25 000j, enzymy trzustkowe, w zaburzeniach trawienia, 20 kapsułek



Cena: 43,96 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-chemie
Substancja czynna	Pancreatinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Pangrol 25 000, 25 000 j. - 20 kapsułek

(Pancreatinum)

### Opis produktu:

- Lek Pangrol 25 000 zawiera enzymy trawienne trzustki (enzymy trzustkowe).

### Skład:

#### Substancja czynna:

Pankreatyna o aktywności:

- Lipazy 25 000 j.Ph.Eur.
- Amylazy 22 500 j. Ph.Eur.
- Proteaz 1 250 j. Ph.Eur.

**Substancje pomocnicze:** kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, olej rycynowy, utwardzany, krzemu dwutlenek bezwodny koloidalny, magnezu stearynian, 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C, trietylu cytrynian, 30% emulsja simeticonu, talk

**kapsułka:** żelatyna, żelaza tlenek czerwony E 172, żółcień chinolinowa E 104, żelaza tlenek żółty E 172, indygotyna E 132, tytanu dwutlenek E 171.

## Wskazania:

Pangrol 25 000 zawiera enzymy trawienne trzustki (enzymy trzustkowe). Lek Pangrol 25 000 stosuje się jako uzupełnienie enzymów trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia wynikającymi z barku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy. Takie zaburzenia mogą wystąpić w wyniku:

- przewlekłego zapalenia trzustki niezależnie od przyczyny,
- swoistej nieprawidłowej czynności trzustki,
- zwężenia przewodu trzustkowego spowodowanego n.p. przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe,
- zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, przebytej operacji trzustki lub wycięcia trzustki i dwunastnicy,
- przyspieszonego pasażu jelitowego po przebytej operacji żołądka i jelit, na skutek stresu lub chorób zapalnych jelit,
- spożywania ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów lub pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony,
- choroby trzewnej,
- chorób zapalnych jelit,
- cukrzycy,
- zespół nabytego braku odporności,
- zespół Shwachmana,
- zespół Sjogrena.

Lek można stosować u osób dorosłych i dzieci.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

- Dawkowanie zależy od stopnia niedoboru enzymów trzustkowych, jak również od dostępności biologicznej leku. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek. Zwiększenie dawkowania wymaga poprzedniej konsultacji z lekarzem.
- Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000 - 20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała.
- O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek leku Pangrol 10 000 na każdy posiłek.
- Kapsułki leku Pangrol 25 000 należy połykać w całości w trakcie posiłku popijając dużą ilością wody.
- Pacjenci, którzy nie są w stanie połknąć kapsułki, mogą wysypać jej zawartość do odpowiedniej ilości płynu i natychmiast zażyć bez rozgrzania lub żucia.

## Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Pangrol 25 000:

- u pacjentów z nadwrażliwością na wieprzowinę lub inny składnik leku Pangrol 25 000,
- u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

## Działania niepożądane :

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W pojedynczych przypadkach, po przyjęciu enzymów trzustkowych, opisywano reakcje alergiczne typu natychmiastowego, takie jak: wysypka skórna, kichanie, łzawienie oczu, skurcz oskrzeli i reakcje alergiczne ze strony przewodu pokarmowego.
- U pacjentów z charakterystycznymi zaburzeniami czynności trzustki (mukowiscydoza), w pojedynczych przypadkach po przyjęciu dużych dawek enzymów trzustkowych, opisywano występowanie zwężeń dolnych fragmentów jelita.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek Pangrol 25 000 zawiera czynne enzymy, które w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i przyjmować lek wyłącznie w sposób zgodny z opisanym.

### Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

- Kapsułki leku Pangrol 25 000 należy połykać w całości w trakcie posiłku popijając dużą ilością wody.

## Stosowanie innych leków:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od wilgoci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

## Podmiot odpowiedzialny:

Berlin-Chemie AG, Berlin, Niemcy

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.